


高等学历-医学综合（试卷）



类目：高等学历继续教育模拟试卷
书名：高等学历-医学综合（试卷）
主编：陈智秀
出版社：河北科学技术出版社
开本：大 16 开
书号：978-7-5717-1202-0
使用层次：成人教育
出版时间：2022 年 11 月
定价：26
印刷方式：双色
是否有资源：是

图书同步精讲课程

—课时多、讲得细、学得快，通过考试更容易—

提升学历就选高等学历继续教育



理论精讲

明确考情
夯实基础



真题讲练

掌握规律
巩固提升



专题突破

把握重点
突破难点



模考训练

模考强化
标准预测

课程说明

本课程视频由一线教师录制。
本课程与最新考试大纲配套。
本课程的学习平台为小书恋学习公众号，扫描右侧二维码观看。

立即扫码



小书恋学习公众号

全国各类高等学历继续教育招生考试备考用书（专科起点升本科）

教材系列

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 政治 | ☐ 英语 | ☐ 高等数学（一） | ☐ 高等数学（二） |
| ☐ 民法 | ☐ 教育理论 | ☐ 医学综合 | ☐ 大学语文 |
| ☐ 艺术概论 | ☐ 生态学基础 | | |

试卷系列

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 政治 | ☐ 英语 | ☐ 高等数学（一） | ☐ 高等数学（二） |
| ☐ 民法 | ☐ 教育理论 | ☒ 医学综合 | ☐ 大学语文 |
| ☐ 艺术概论 | ☐ 生态学基础 | | |

ISBN 978-7-5717-1202-0



9 787571 712020

定价：26.00元

责任编辑：王文静
责任校对：李蔚蔚
美术编辑：张帆

医学综合

● 专科起点升本科

主编 陈智秀

精讲·精练·精析

互联网+ 视频课程
精美课件 移动学习
在线题库 同步强化
全新真题 学练结合

河北科学技术出版社

图书在版编目（CIP）数据	
医学综合：专科起点升本科/陈智秀主编. —石 家庄：河北科学技术出版社，2022.9	
全国各类高等学历继续教育招生考试真题汇编及全真 模拟/张东红主编	
ISBN 978-7-5717-1202-0	
i.①医…u.①陈…m.①医学一成人高等教育一 习题集一升学参考资料 W.①R—44	
中国版本图书馆 CIP 数据核字（2022）第 156611 号	
医学综合专科起点升本科	
YIXUE ZONGHE ZHUANKE QIDIAN SHENG BENKE	
主编陈智秀	
出版发行河北科学技术出版社	
地 址 石家庄市友谊北大街 330 号（邮编：050061）	
印 刷唐山唐文印刷有限公司	
开 本 787 毫米 X1092 毫米 1/8	
印 张 7.5	
字 数 150 千字	
版 次 2022 年 9 月第 1 版	
印 次 2022 年 9 月第 1 次印刷	
定 价 26.00 元	

目录

2022 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合（专升本）试题.....	（1-11）
2022 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合（专升本）试题参考答案	（12）
2021 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合（专升本）试题	（1-11）
2021 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合（专升本）试题参考答案	（12）
2020 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合（专升本）试题	（1-11）
2020 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合（专升本）试题参考答案	（12）
2019 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合（专升本）试题	（1-11）
2019 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合（专升本）试题参考答案	（12）
2018 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合（专升本）试题	（1-11）
2018 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合（专升本）试题参考答案	（12）
医学综合全真模拟试卷（一）	（1-11）
医学综合全真模拟试卷（一）参考答案	（12）
医学综合全真模拟试卷（二）	（1-11）
医学综合全真模拟试卷（二）参考答案	（12）
医学综合全真模拟试卷（三）	（1-11）
医学综合全真模拟试卷（三）参考答案	（12）
医学综合全真模拟试卷（四）	（1-11）
医学综合全真模拟试卷（四）参考答案	（12）
医学综合全真模拟试卷（五）	（1-11）
医学综合全真模拟试卷（五）参考答案	（12）

2022 年成人高等学校招生全国统一考试
医学综合（专升本）试题

题号	一	二	三	总分
得分				

得分	评卷人

一、A 型题（1~44 小题, 每小题 1.5 分；45~54 小题, 每小题 2 分；共 86 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中, 请选出一项最符合题目要求的。）

•E

1. 棘突呈叠瓦状排列的椎骨是（ ）
- A_颈椎

B.胸椎

C.腰椎

D.骰骨
2. 合成胆总管的是（ ）
- A_肝左管和肝右管

B.肝右管和肝总管

C.肝左管和肝总管

D.胆囊管和肝总管
3. 站立时女性腹膜腔的最低部位是（ ）
- A.阴道前穹

B.阴道后穹

C.膀胱子宫陷凹

D.直肠子宫陷凹
4. 右主支气管的特点是（ ）
- A 细而长

B.走向较陡直

C.粗而长

D.走向较水平
5. 包被肾和肾上腺的结构是（ ）
- A,肾筋膜

B.肾脂肪囊

C.肾纤维囊

D.肾周围脂肪
6. 射精管的开口部位是（ ）
- A 尿道前列腺部

B.尿道膜部

- C.尿道海绵体部
- D.尿道球

7. 上腔静脉注入的部位是（ ）

- A.左心房
- B.左心室
- C.右心房
- D.右心室

8. 下列属于腹腔干分支的是（ ）

- A.脾动脉
- B.胃右动脉
- C.胃网膜右动脉
- D.胃网膜左动脉

9. 膝反射消失可能受损的神经是（ ）

- A.股神经
- B.胫神经
- C.腓深神经
- D.腓浅神经

10. 大脑皮质角回属于（ ）

- A 视觉性语言区
- B.书写区
- C.运动性语言区
- D.听觉性语言区

11. 下列属于中耳的结构是（ ）

- A•耳蜗
- B.前庭
- C.半规管
- D.鼓室

12. 决定神经细胞动作电位幅度的因素是（ ）

- A_刺激强度
- B.刺激持续时间
- C.离子平衡电位
- D.阈电位水平

13. 血液凝固的实质是（ ）

- A 纤维蛋白原转变为纤维蛋白
- B.纤维蛋白的降解
- C.凝血因子则的激活
- D.血小板聚集

14. 心率超过 180 次/分, 对心动周期最明显的影响是（ ）

- A•等容收缩期延长
- B.快速射血期缩短
- C.等容舒张期延长
- D.快速充盈期缩短

15. 收缩压的高低主要反映的是（ ）

- A 心率
- B.外周阻力
- C.循环血量
- D.每搏输出量

16. 影响气道阻力最重要的因素是（ ）

- A 气流速度
- B.气流形式
- C.气道长度
- D.气道口径

17. 长期不能进食时，人体供能的主要方式是（ ）

A.糖转化为蛋白质 B.糖转化为脂肪

c.脂肪转化为蛋白质 D.蛋白质转化为糖

18. 肾素-血管紧张素系统被激活后产生的效应是（ ）

A.醛固酮分泌减少 B.肾上腺素分泌减少

C.终尿水的排出增加 D.终尿 Na+的排出减少

19. 与正视眼相比，近视眼的特点是（ ）

A.近点远，远点近 B.近点和远点都远

c.近点近，远点远 D.近点和远点都近

20. 突触前抑制应该具备的突触结构类型是（ ）

A.胞体一胞体型 B.轴突一胞体型

C.轴突一轴突型 D.轴突一树突型

21. 下列不属于快波睡眠的特征是（ ）

A.肌紧张减弱 B.间断性心率加快

C.脑内蛋白质合成加快 D.生长激素分泌明显增多

22. 生物活性最强、作用最迅速的甲状腺激素是（ ）

A.一碘酪氨酸 B.二碘酪氨酸

C.三碘甲腺原氨酸 D.四碘甲腺原氨酸

23. 女,17 岁。1 周前眼睑水肿，现进展为全身水肿。最可能的原因是（ ）

A.心源性水肿 B.肝源性水肿

c.黏液性水肿 D.肾源性水肿

24. 健康成人进行体格检查时，肺的叩诊音性质为（ ）

A.清音 B.过清音

C.鼓音 D.浊音

25. Horner 综合征的表现不包括（ ）

A.瞳孔缩小 B.眼睑下垂

C.眼球内陷 D.麻痹性斜视

26. 男,75 岁。咳喘 30 年。查体:胸廓前后径与横径之比为 1： 1,肋骨与脊柱夹角大于 45。。

胸廓的形态为（ ）

A.正常胸廓 B.扁平胸

C.漏斗胸 D.桶状胸

27. 女,50 岁。平卧位腹部视诊为“蛙腹”。最可能存在的病理状态是（ ）

A_腹腔大量积气 B.腹腔大量积液

C.巨大卵巢囊肿 D.胰腺囊肿

28. 女,40 岁。心悸、呼吸困难、消瘦、腹胀 3 个月来诊。查体:BP105/85mmHg,心音明显减弱。最可能的病因是（ ）

A 二尖瓣狭窄 B.甲状腺功能亢进症

C.缩窄性心包炎 D.主动脉瓣关闭不全

29. 下列不属于既往史的是（ ）

A 传染病史 B.外伤手术史

C.婚姻生育史 D.药物过敏史

30. 不属于脑膜刺激征检查内容的是（ ）

A 颈强直 B.Kernig 征

C.Brudzinski 征 D. Babinski 征

31. 女,45 岁。心悸 1 个月，心电图示同一导联可见 5 个不连续的期前出现的宽大畸形 QRS 波,其前无 P 波,T 波方向与主波方向相反,为完全性代偿间歇。其心律失常为（ ）

A_室性心动过速 B.频发室性期前收缩

C.窦性心律不齐 D.房室传导阻滞

32. 血常规检查结果异常的是（ ）

A•红细胞计数 4.5X10¹²/L B.白细胞计数 4.9X10⁹/L

C.网织红细胞 1.5% D.血小板计数 44X10⁹/L

33. 尿常规检查不正常的结果是（ ）

A•离心尿镜检 RBC 2/HP B.离心尿镜检 WBC 4/HP

C.尿胆原定性弱阳性 D.尿胆红素定性阳性

34. 高钾血症的典型心电图表现是（ ）

A.P-R 间期延长 B.T 波低平

C.T 波高尖 D.T 波倒置

35. 破伤风患者通常最先受影响的肌群是（ ）

A■膈肌 B.四肢肌

C.表情肌 D.咀嚼肌

36. 男，21 岁。因外伤致脾破裂，紧急行脾切除术。术中输血 15ml 时发现术野渗血不止，同时伴血压下降。应考虑输血并发症是（ ）
- A.发热反应
B.过敏反应
C.溶血反应
D.细菌污染反应
37. 在血液成分制品中，冷沉淀属于（ ）
- A.血细胞成分
B.血浆代用品
C.血浆成分
D.血浆蛋白成分
38. 急性肾衰竭少尿期常见的电解质紊乱是（ ）
- A.低磷血症
B.高钾血症
C.低镁血症
D.高氯血症
39. 最易引起急性呼吸窘迫综合征的疾病是（ ）
- A.急性阑尾炎
B.急性胃肠炎
C.急性胆囊炎
D.重症肺炎
40. 下列属于恶性肿瘤的疾病是（ ）
- A.体表脂肪瘤
B.纤维黄色瘤
C.神经纤维瘤
D.黑色素瘤
41. 成人胸外心脏按压时，要在胸骨下 1/2 处垂直向胸骨加压，使胸骨下陷（ ）
- A.2~3cm
B. 5 ~6cm
C.7 ~9cm
D.10 ~12cm
42. 按中国新九分法，头颈面加躯干烧伤，烧伤面积的百分比是（ ）
- A.9%
B.18%
C.27%
D.36%
43. 男，34 岁。右手被开水烫伤 2 小时，局部红肿，有大小不一的水疱形成，创面红润，疼痛明显。其烧伤深度是（ ）
- A.I°烧伤
B.浅 II 度烧伤
C.深 II 度烧伤
D.DI 度烧伤
44. 关于心肺复苏时药物治疗目的的叙述，错误的是（ ）
- A.防治心律失常
B.激发心脏复跳
C.增强心肌迷走神经的张力
D.增强心肌收缩力

（45~47 题共用题干）

男，20 岁。高热、咳脓性带臭味痰 1 周。既往 1 个月前有拔牙史。

45. 最可能感染的病原体是（ ）

- A 肺炎链球菌
B.肺炎支原体
C.结核分枝杆菌
D.厌氧菌

46. 对诊断最有意义的辅助检查是（ ）

- A•胸部 X 线
B.肺功能
C.血常规
D.红细胞沉降率

47. 最可能的诊断是（ ）

- A 肺炎链球菌肺炎
B.肺结核
C.肺脓肿
D.肺癌

（48~50 题共用题干）

男,45 岁。腹痛伴呕吐大量酸臭食物 2 天。3 年前曾诊断“十二指肠球部溃疡”，幽门螺杆菌检测结果为阳性，未规范治疗。

48. 最可能出现的体征为（ ）

- A 移动性浊音阳性
B.振水音阳性
C.肠鸣音消失
D.液波震颤阳性

49. 最可能的诊断是（ ）

- A_反流性食管炎
B.急性胰腺炎
C.幽门梗阻
D.急性胆囊炎

50. 最重要的进一步检查是（ ）

- A.胃肠减压后行胃镜检查
B.病理学检查
C.腹部 B 超
D.幽门螺杆菌检测

（51~52 题共用题干）

男，70 岁。背部肿痛 3 天。糖尿病病史 10 年。查体:体温 38.5℃,脉搏 90 次/分。背部有一直径 10cm 区域隆起，红热硬肿，压痛明显，表面有多个脓点。

51. 最可能的诊断是（ ）

- A.Jp
B.疖
C.皮下急性蜂窝织炎
D.丹毒

52. 此疾病的最佳局部处理措施为（ ）

- A•热敷
B.碘伏涂抹

- C.50%硫酸镁湿敷
- D.做 “+” 或”++” 形切开引流

（53～54 题共用题干）

男,40 岁。背部肿物常继发感染 2 年来诊。查体:左背部皮下有一直径 2cm 肿物,边界清 楚,无压痛,与皮肤有粘连,中心有一黑点。

53. 此肿物最可能的诊断是（ ）

- A.脂肪瘤
- B.黑痣
- C.皮脂囊肿
- D.皮样囊肿

54. 该患者最恰当的治疗是（ ）

- A.切取活检
- B.病灶切除
- C.细针穿刺活检
- D.扩大切除

得分	评卷人

二、B 型题（55～70 小题，每小题 1.5 分，共 24 分。A、B、C、D 是其下
 两道小题的备选项，请从中选择一项最符合题目要求的，每个选项可 以
 被选择一次或两次。）

- A.幽门窦
- B.胃底
- C.幽门管
- D.胃体

55. 与十二指肠上部相连接的部分是（ ）

56. 贲门平面以上的部分是（ ）

- A.中央前回
- B.延髓
- C.绒球
- D.硬脑膜

57. 属于脑干的结构是（ ）

58. 属于端脑的结构是（ ）

- A.分配血管
- B.弹性贮器血管
- C.交换血管
- D.容量血管

59. 主动脉和肺动脉主干的类型属于（ ）

60. 中动脉的类型属于（ ）

- A.去甲肾上腺素
- B.乙酰胆碱
- C.甘氨酸
- D.5-羟色胺

61. 骨骼肌运动神经末梢释放的递质是（ ）

62.自主神经节前纤维释放的递质是（ ）

- A.化脓性腹膜炎
- B.上消化道出血

- C.结核病
- D.胃溃疡并穿孔

63. 女,40 岁。发热、盗汗、消瘦半年。腹部视诊呈舟状腹。最可能的诊断是（ ）

64. 男，32 岁。规律性上腹痛 2 年,突发腹部剧痛 2 小时。腹部触诊为板状腹。最可能的诊

断是（ ）

- A.麦氏点
- B.脐部
- C.中输尿管点
- D.肋脊角

65. 典型急性阑尾炎的压痛部位是（ ）

66. 肾盂肾炎患者最可能出现的压痛部位是（ ）

- B.U/甲
- C.I/乙
- D.U/乙

67. 甲状腺瘤切除术后切口愈合良好，记录切口愈合情况为（ ）

68. 胆
囊切除术后切口有红肿、硬结，记录切口愈合情况为（ ）

- A.挫伤
- B.擦伤
- C.扭伤
- D.切割伤

69. 男,22 岁。骑自行车摔倒，右踝部肿胀，活动困难,皮肤无破损。其损伤类型属于（ ）

70. 男，32 岁。左大腿被重物压伤 6 小时，皮肤无破损，局部肿胀明显。其损伤类型属
 于（ ）

得分	评卷人

三、X 型题（71～90 小题。每小题 2 分，共 40 分。在每小题给出的
 A、B、C、D 四个选项中，至少有两项是符合题目要求的，请选出所 有
 符合题目要求的答案，多选或少选均不得分。）

71. 属于消化腺的器官有（ ）

- A.肝
- B.腮腺
- C.胰
- D.脾

72. 下列属于锁骨下动脉的分支有（ ）

- A 椎动脉
- B.胸廓内动脉
- C.甲状腺上动脉
- D.甲状颈干

73. 下列属于淋巴系统的有（ ）

- A.淋巴管
- B.淋巴结
- C.脾
- D.肝

74. 参与桡腕关节组成的结构有（ ）

： A.尺骨下端 B.桡骨下端
； C.手舟骨 D.月骨
1
i

75. 主动脉弓的分支有（ ）

A.左颈总动脉 B.左锁骨下动脉
i C.头臂干 D.冠状动脉

76. 细胞兴奋性低于正常的时期有（ ）

A.绝对不应期 B.相对不应期
；
1 C.超常期 D.局部反应期
i

77. 缩胆囊素的作用有（ ）

A.促进胰酶的分泌 B.对胰腺的营养作用
i
i C.抑制胃液的分泌 D.抑制肠运动

78. 卵巢分泌的激素有（ ）

A.雌二醇 B.孕酮
睫 C.卵泡刺激素 D.抑制素

如 79. 肺表面活性物质的作用包括（ ）

A.防止肺泡萎陷 B.增加吸气阻力
柠
欠 C.稳定大小肺泡的容积和内压 D.防止肺水肿

羔 80. 可以增加终尿量的因素有（ ）

A.循环血量减少 B.抗利尿激素分泌减少
報
館 C.醛固酮分泌增多 D.肾血流量增加

i 81. 可能引起颈静脉怒张的原因有（ ）

A.左心衰竭 B.右心衰竭
； C.肾盂积水 D.上腔静脉阻塞综合征
1

： 82. 反映自主神经调节功能的检查包括（ ）

A.膝反射 B.角膜反射
； C.皮肤划痕试验 D.卧立位试验

：83. 腰椎穿刺术的禁忌证包括（ ）

A.脑膜炎 B.休克
；
1 C.穿刺部位皮肤感染 D.脑疝
i

； 84. 大量心包积液患者可能出现的体征包括（ ）

A.颈静脉怒张 B.心界扩大
； C.奇脉 D.心音增强

85. 可用于肝脏触诊检查的方法包括（ ）

A.浅部触诊法 B.深部滑行触诊法
C.双手触诊法 D.冲击触诊法

86. 代谢性酸中毒的原因包括（ ）

A.肠道内体液大量丧失 B.体内 HCO₃⁻ 减少
C.有效循环不足 D.呼吸道梗阻

87. 肠外营养的并发症包括（ ）

A.电解质紊乱 B.肠道免疫功能障碍
C.高血糖 D.肝脏损害

88. 创伤并发症包括（ ）

A.感染 B.休克
C.应激性溃疡 D.凝血功能障碍

89. 输血的适应证有（ ）

A.大量失血 B.严重贫血
C.重症感染 D.凝血异常

90. 切口感染的预防措施包括（ ）

A.术中严格遵守无菌原则 B.操作精细、严密止血
C.术前、术后提高免疫力 D.常规应用抗生素

2022 年成人高等学校招生全国统一考试
医学综合（专升本）试题参考答案

一、A 型题

1.B 2.D 3.D 4.B 5.A 6.A 7.C 8.A 9.A 10.A

11.D 12.C 13.A 14.D 15.D 16.D 17.D 18.D 19.D 20.C

21.D 22.C 23.D 24.A 25.D 26.D 27.B 28.C 29.C 30.D

31.B 32.D 33.D 34.C 35.D 36.C 37.C 38.B 39.D 40.D

41.B 42.D 43.B 44.C 45.D 46.A 47.C 48.B 49.C 50.A

51.B 52.D 53.C 54.B

二、B 型题

55.C 56.B 57.B 58.A 59.B 60.A 61.B 62. B 63.C 64.D

65. A 66.D 67.A 68.D 69.C 70.A

MIS?

三、X 型题

71. ABC 72.ABD 73.ABC 74.BCD 75.ABC 76.ABD 77.ABC

78.ABD 79.ACD 80.BD 81.BD 82.CD 83.BCD 84.ABC

85.BCD 86.ABC 87.ABCD 88.ABCD 89.ABCD 90.ABC

2021 年成人高等学校招生全国统一考试
医学综合（专升本）试题

题号	一	二	三	总分
得分				

得分	评卷人

一、A 型题（1~44 小题, 每小题 1.5 分；45~54 小题, 每小题 2 分；共 86 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中, 请选出一项最符合题目要求的。）

1. 冠状动脉的起始部位是（）
A_左心室
C.胸主动脉
B.主动脉弓
D.升主动脉
2. 心脏内兴奋传导最慢的组织是（）
A 窦房结
C.房室结
B.浦肯野纤维
D.心室肌
3. 不含消化酶的消化液是（）
A_胰液
C.胆汁
B.胃液
D.肠液
4. 下列描述中属于症状的是（）
A_脾大
C.肺部啰音
B.心脏杂音
D.心悸
5. 属于腹膜内位器官的是（）
A 横结肠
C.降结肠
B.直肠
D.升结肠
6. 属于肾锥体的结构是（）
A.肾窦
C.肾小盏
B.肾乳头
D.肾柱

7. 具有上行唤醒作用的神经结构被称为（）
A.特殊感觉传入纤维
B.本体感觉传入通路
C.内脏感觉传入神经
D.感觉的非特异性投射系统
8. 调节产热活动最重要的体液因素是（）
A.甲状腺激素
C.胰岛素
B.甲状旁腺激素
D.生长激素
9. 房水产生的部位是（）
A.睫状体
C.角膜
B.虹膜
D.脉络膜
10. 胸膜下界的体表投影在腋中线相交于（）
A 第 8 肋
C.第 10 肋
B.第 9 肋
D.第 11 肋
11. 可做环转运动的关节是（）
A 膝关节
C.肘关节
B.踝关节
D.桡腕关节
12. 输血应遵循的原则是（）
A_受血者红细胞不被供血者血清凝集
B.供血者和受血者的凝集素含量应相等
C.受血者红细胞不发生叠连
D.供血者红细胞不被受血者血清凝集
13. 胆汁瘀积性黄疸典型的临床表现是（）
A 尿呈酱油色
C.贫血、脾大
B.腰背疼痛
D.陶土样粪便
14. 腹部九分法脾的位置在（）
A 上腹部
C.右季肋部
B.中腹部
D.左季肋部
15. 迅速失血可导致休克，出血量至少超过全身总血量的比例是（）
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
16. 需长期肠外营养支持者，首选的穿刺血管是（）
A_颈外静脉
C.颈内静脉
B.大隐静脉
D.腘静脉

:17. 视近物时，形态改变最显著的眼结构是（）

- ；
i
- A.巩膜
C.玻璃体
- B.角膜
D.晶状体

i 18. 女,51 岁。下列问诊中属于个人史的是（）

- ；
i
- A.出生地与居住地
B.闭经日期，绝经年龄
C.结婚年龄,配偶健康状况
D.妊娠与生育次数

19. 男，62 岁。急性心肌梗死第 2 天，排便中突发呼吸困难。查体:BP 90/70mmHg,P 120 次/分，呼吸急促,双肺满布湿啰音及哮鸣音。最可能的诊断是（）

- ；
i
- A.乳头肌功能不全
B.支气管哮喘
c.急性心脏压塞
D.急性左心衰竭

如 20. 静脉补钾速度一般每小时不宜超过（）

- K⁻
•E
- A. 70mmol
C.50mm0l
- B. 60 mmol
D. 20 mmol

羔 21. 急性肾衰竭少尿期或无尿期，需紧急处理的电解质紊乱是（）

- 報
館
- A.高钾血症
B.高钠血症
C.低氯血症
D.低镁血症

i 22. 下列最符合内环境稳态概念的描述是（）

- ；
i
- A.组织液理化性质相对稳定
B.血浆各成分保持恒定
C.细胞质渗透压稳定
D.细胞内液 pH 相对稳定

！ 23. 汇合形成上腔静脉的是（）

- ；
i
- A.颈内静脉与锁骨下静脉
B.左、右头臂静脉
C.颈内静脉与奇静脉
D.颈外静脉与锁骨下静脉

i 24. 腭扁桃体所在的位置是（）

- B. 喉咽侧壁
A.鼻咽侧壁

C. 口咽侧壁

D. 喉前庭侧壁

25.男，66 岁。反复咯血 3 年。查体:双下肺固定湿啰音，胸部 X 线片提示双下肺纹理粗乱。最可能的诊断是（）

- A. 支气管扩张症
B. 结核性胸膜炎
C. 支气管肺炎
D. 肺脓肿

26. 患者血气分析报告：pH 7.24,PaCO₂ 76mmHg,PaO₂ 55mmHg,HCO⁻ 32mmol/L,BE 4. 5mmol/L。应判定为（）

- A_失代偿性代谢性酸中毒
B. 失代偿性呼吸性碱中毒
C. 代偿性呼吸性酸中毒
D. 失代偿性呼吸性酸中毒

27.女,62 岁。诊断为胃癌。查体:血压 150/100mmHg,消瘦，重度贫血。下列术前准备中，不必要的项目是（）

- A•纠正贫血
B. 血压降至正常
C. 检测肝功能
D.改善营养状态

28.男，60 岁。餐后突感上腹痛、大汗 1 小时。查体:腹肌紧张，压痛、反跳痛（+）,肝浊音界 消失。此时应首选的检查是（）

- A. 立位腹平片
C.腹部 B 超
- B.血、尿淀粉酶
D.心电图

29. 静脉快速注入大量生理盐水、血浆蛋白合成减少、血浆蛋白丢失，可导致（）

- A 有效滤过压下降，肾小球滤过率减少
B. 血浆胶体渗透压下降，肾小球滤过率增加
C. 肾血流量和血压下降
D. 囊内压增高，有效滤过压下降

30. 代谢性碱中毒常同时存在的电解质紊乱是（）

- A_高钾血症
C. 高钠血症
- B.低钠血症
D.低钾血症

31. 男, 18 岁。因急性阑尾炎穿孔行阑尾切除术。术后 3 天切口红肿, 有脓性分泌物, 将缝

- A.ni/丙 B.』 /乙
C.U/丙 D.U/乙

32. 可使氧解离曲线左移的情况是 ()

- A. 血 pH 降低
B. 组织温度升高
C. 血二氧化碳分压降低
D. 2,3-二磷酸甘油酸浓度升高

33. 第 1、2 掌骨间隙背面（虎口区）的皮肤出现感觉障碍可能损伤的神经是（ ）

- A.肌皮神
B.桡神经
C.尺神经
D.正中神经

34. 属于男性输精管道的是 ()

- A. 睪丸
B. 尿道球腺
C. 精囊腺
D. 附睪

關 35. 下列关于丹毒的描述，正确的是（ ）

- A.好发于下肢与面部
B.感染多发生于皮下
C.金黄色葡萄球菌是常见病原菌
D.切开引流是治疗的关键

36. 女,32 岁。查体:心界叩诊不大,心率 72 次/分,律齐增强,可闻及开瓣音,心尖部闻及舒张期隆隆样杂音。最可能的诊断是 ()

- A. 主动脉瓣狭窄
B. 房间隔缺损
C. 室间隔缺损
D. 二尖瓣狭窄

37. 衡量细胞兴奋性大小的常用指标是 ()

- A.静息电位大小
B.阈强度大小
C.动作电位幅度
D.动作电位宽度

38. 男, 70 岁。有慢性支气管炎病史 30 年。受凉后突发气促、烦躁 3 天。查体: 口唇发绀。呼吸 36 次/分, 脉率 100 次/分, 双肺闻及哮鸣音。首选的辅助检查是 ()

- A.心电图

39. 手术患者术前 8~12 小时禁食、4 小时禁水的目的是 ()

- A.防止麻醉时呕吐引起窒息
B.防止术后腹胀
C.减少术后感染
D.防止术后伤口裂开

40. 防止子宫脱垂的主要结构是 ()

- A.子宮圓韌帶
B.子宮主韌帶
C.子宮闊韌帶
D.子宮龍韌帶

41. 发生突触后抑制时可见到的现象是 ()

- A_突触前膜递质释放减少
B.突触后膜递质水解酶失活
C.突触后膜受体数量减少

42. 女,70岁。上腹痛伴黄疸。触诊胆囊时,患者深吸气因疼痛而终止的征象提示 ()

- A_腹膜刺激征阳性
B. Murphy 征阳性
C.肝颈静脉回流征阳性

43. 下列不符合破伤风临床表现的是 ()

- A.抽搐时意识不清
- B.发作时可出现面唇发紺、通气困难
- C.可出现角弓反张
- D.肌肉痉挛通常最初发生在咀嚼肌

44. 判断心脏按压是否有效的方法是 ()

- A. 触摸面动脉搏动
B. 触摸颈动脉搏动
C. 触摸桡动脉搏动
D. 触摸足背动脉搏动

(45~47 题共用题干)

女,23岁。低热,盗汗,胸闷2周。胸部X线片提示右侧大量胸腔积液。

45. 该患者最可能出现的肺部体征是 ()

- A_右中下肺叩诊鼓音
B.右中下肺叩诊清音

61. 体表投影在右锁骨中线与右肋弓交点稍下方的结构是（ ）
62. 在肝十二指肠韧带内走行的结构是（ ）
- A.白色念珠菌

B.变形杆菌

C.金黄色葡萄球菌

D.类杆菌
63. 市、痢常见的致病菌是（ ）
64. 真菌性脓毒症常见的致病菌是（ ）
- A.右手抬高患者下肢，在 30°内出现由上至下的放射性疼痛

B.使患者一侧下肢屈髓屈膝呈 90°,抬高小腿伸膝 V135°且伴疼痛

C.一手托患者枕部使颈前屈，两侧髓关节及膝关节出现屈曲

D.用力推滑患者胫骨前缘，出现：趾缓缓背伸，四趾散开
65. Brudzinski 征阳性是指（ ）
66. Kerning 征阳性是指（ ）
- A.胃右动脉

B.胃左动脉

C.脾动脉

D.肠系膜下动脉
67. 发出分支供应胃底的动脉是（ ）
68. 发出胰支的动脉是（ ）
- A.骨肉瘤

B.脂肪瘤

C.血管瘤

D.皮肤乳头状瘤
69. 属于恶性肿瘤的是（ ）
70. 最易癌变的肿瘤是（ ）

睫

长
MIS
?

報

得分	评卷人

三、X 型题（71~90 小题。每小题 2 分，共 40 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，至少有两项是符合题目要求的，请选出 所有符合题目要求的答案，多选或少选均不得分。）

- C.肠干
- D.右腰干
74. 下列属于病理反射的有（ ）
- A.Babinski 征

B.Oppenheim 征

C.肱二头肌反射

D.極骨膜反射
75. 急性肾衰竭少尿期或无尿期出现水中毒的常见原因有（ ）
- A.体内水分大量蓄积

B.酸中毒

C.钠中毒

D.体内内生水过多
76. 肠外营养的并发症有（ ）
- A.恶心、呕吐、肠痉挛

B.肝损害

C.气胸、空气栓塞

D.氨基酸代谢紊乱
77. 腹腔积液的检查方法有（ ）
- A.移动性浊音

B.振水音

C.液波震颤

D.水坑征
78. 神经纤维传导兴奋的特征是（ ）
- A.易衰减

B.易疲劳

C.完整性

D.绝缘性好
79. 男，57 岁。患心脏瓣膜病 10 年。 查体：BP 140/50~30mmHg,双侧桡动脉可触及水冲脉，主动脉瓣区可闻及舒张期叹气样杂音。还可能出现的体征有（ ）
- A.Duroziez 双重杂音

B.股动脉枪击音

C.奇脉

D.毛细血管搏动征
80. 属于心传导系的结构有（ ）
- A.窦房结

B.房室结

C.锥体束

D.房室束
81. 参与膝关节组成的骨有（ ）
- A.胫骨

B.腓骨

C.股骨

D.髌骨
82. 女,56 岁。饱餐后半小时出现上腹痛急诊就诊。可能引起上述症状的疾病有（ ）
- A.心绞痛

B.急性胰腺炎

C.急性阑尾炎

D.胃溃疡并穿孔
83. 等渗性脱水的临床表现有（ ）
- A.口渴

B.乏力、少尿

C.恶心、呕吐

D.皮肤干燥
84. 保持肾小球滤过率基本稳定的全身动脉血压范围包括（ ）
- A.50~70mmHg

B.80 ~100mmHg

：	C.110~130mmHg	D.140~160mmHg
85. 输精管的分部有（ ）	A.睪丸部	B.精索部
	C.腹股沟管部	D.盆部
86. 影响心输出量的因素有（ ）	A.循环血量	B.a 受体阻断剂
	C.心率	D.心室舒张末期容积
87. 输血时出现发热反应的原因有（ ）	A.免疫反应	B.致热原
	C.蛋白质过敏	D.循环超负荷
88. 属于检查肾小球功能的实验室项目有（ ）	A.血肌酐	B.尿渗透压
	C.内生肌酐清除率	D.血尿素氮
89. 胃和小肠共有的运动形式有（ ）	A.分节运动	B.紧张性收缩
	C.容受性舒张	D.蠕动
90.可引起肾性急性肾衰竭的病因有（ ）	A.前列腺增生	B.感染性休克
MIS?	C.挤压综合征	D.手术误扎双侧输尿管
報		

医学综合（专升本）试题参考答案

一、A 型题

1.D	2.C	3.C	4.D	5.A	6.B	7.D	8.A	9.A	10.C
11.D	12.D	13.D	14.D	15.A	16.C	17.D	18.A	19.D	20.D
21.A	22.A	23.B	24.C	25.A	26.D	27.B	28.A	29.B	30.D
31.A	32.C	33.B	34.D	35.A	36.D	37.B	38.C	39.A	40.B
41.D	42.B	43.A	44.B	45.D	46.D	47.A	48.C	49.B	50.B
51.D	52.A	53.D	54.A						

二、B 型题

55.A	56.B	57.C	58.A	59.B	60.A	61.A	62.B	63.C	64.A
65.C	66.B	67.C	68.C	69.A	70.D				

三、X 型题

71.ABCD	72.AD	73.ACD	74.AB	75.AD	76.BCD	77.ACD
78.CD	79.ABD	80. ABD	81.ACD	82.ABCD	83.BCD	84.BCD
85.ABCD	86.CD	87.AB	88.ACD	89.BD	90.BC	

2020 年成人高等学校招生全国统一考试
医学综合（专升本）试题

题号	一	二	三	总分
得分				

一、A 型题（1—84 小题，每小题 1.25 分。共 105 分。在每小题给出 的 A、B、C、D、E 五个选项中，请选出一项最符合题目要求的。）

得分	评卷人

- E
1. 下列属于下回后部代表的中枢是（ ）
- A.书写中枢

B.听中枢

C.感觉性语言中枢

D.视觉性语言中枢

E.运动性语言中枢
2. 下列不属于急性上消化道出血临床表现的是（ ）
- A.上腹部压痛阳性

B.柏油便

C.呕吐咖啡样物质

D.听诊肠鸣音活跃

E.可出现头晕、心悸
3. 肺门的所在部位是（ ）
- A.肺的膈面

B.肺的纵隔面

C.肺的胸肋面

D.肺底

E.肺尖的内面
4. 两侧同时收缩，使脊柱后伸的肌是（ ）
- A.背阔肌

B.竖脊肌

C.胸大肌

E.腹直肌

D.斜方肌
5. 不属于预防性应用抗菌药物适应证的选项是（ ）
- A.人造物置留手术

B.甲状腺腺瘤手术后

C.结肠手术前准备

D.开放性骨折

E.大面积烧伤
6. 破伤风的治疗原则是（ ）
- A. 预防和抢救休克

B. 早期行气管切开

C.应用破伤风类毒素

D.消除毒素来源、中和毒素、控制和解除痉挛

- E.高压氧治疗
7. 男性患者有尿道外括约肌环绕尿道的部位是（ ）
- A.尿道内口

B.尿道外口

C.尿道前列腺部

E.尿道膜部

D.尿道球部
8. 手术中识别输卵管的标志是（ ）
- A.输卵管漏斗

B.输卵管峡

C.输卵管伞

E.输卵管腹腔口

D.输卵管壶腹
9. 与阴道后穹后方相邻的腹膜间隙是（ ）
- A.卵巢窝

B.膀胱上窝

C.膀胱子宫陷凹

E.直肠子宫陷凹

D.直肠膀胱陷凹
- 10.三尖瓣所在的位置是（ ）
- A.左房室口

B.肺动脉口

C.主动脉口

E.右房室口

D.冠状窦口
11. 增加冠脉血流量最主要的因素是（ ）
- A.交感神经兴奋

B.迷走神经兴奋

C.血管紧张素 II 分泌增多

E.血管升压素分泌增多

D.心肌代谢增强
12. 注入乳糜池的淋巴干是（ ）
- A.左颈干

B.右锁骨下干

C.左锁骨下干

E.肠干

D.右颈干
13. 不属于中耳的结构是（ ）
- A.前庭

B.乳突小房

C.鼓室

E.咽鼓管

D.乳突窦
14. 具有横突肋凹的椎骨是（ ）
- A 骶骨

B.尾骨

C.胸椎

E.腰椎

D.颈椎
15. 第 2~4 手指不能内收与外展，可能损伤的神经是（ ）
- A.肌皮神经

B.正中神经

C.尺神经

E.腋神经

D.桡神经
16. 男，48 岁。近期健康体检报告示：血 BUN 6.0mmol/L,总胆红素 12.7/mol/L,AST 71 U/L,空腹血糖 6.0mmol/L,总胆固醇 7.5mmol/L。临床的诊断是（ ）
- A. 肾功能不全伴黄疸

B.肝功能异常伴血脂异常

C. 肝功能衰竭伴黄疸

D.糖尿病伴肾功能不全

E.糖尿病伴血脂异常
17. 间脑的分部中包括外侧膝状体的是（ ）
- A.后丘脑

B.底丘脑

C.背侧丘脑

E.上丘脑

D.下丘脑

18. 一侧视交叉外侧部的不交叉纤维损伤时，引起的视野缺损是（ ）
- A. 双眼视野鼻侧半偏盲
C. 双眼视野对侧半同向性偏盲
E. 患侧眼全盲
19. 呕血与咯血最重要的鉴别点是（ ）
- A. 是否为大出血
B. 是否伴有恶心
D. 是否伴有发热
20. 不属于机体内环境的体液是（ ）
- A. 淋巴液
B. 组织液
D. 脑脊液
21. 不受动眼神经支配的眼肌是（ ）
- A. 下直肌
B. 上睑提肌
D. 内直肌
22. 睫状肌收缩时，瞳孔括约肌收缩，引起瞳孔缩小。下列哪项不是瞳孔缩小的作用？
- A. 增加视网膜成像的清晰度
B. 减少球面像差
C. 减少色像差
D. 减少球差
23. 有助于鉴别肾前性和肾后性急性肾衰竭的检查是（ ）
- A. 肾穿刺活检
B. 血常规
C. 血尿素氮和肌酐
D. 磁共振水成像
E. 每小时尿量
24. 用已知 ABO 血型的血清可以鉴定的红细胞膜上的成分是（ ）
- A. 动眼神经
B. 面神经
D. 上颌神经
25. 造成心室前负荷增大的因素是（ ）
- A. 心肌收缩力增强
C. 心室充盈量增大
E. 心室顺应性减小
26. 最常见于老年人额头部的灰黑色斑块是（ ）
- A. 乳头状疣
B. 黑色素瘤
C. 老年斑
E. 皮肤癌
27. 提高心肌传导性的因素是（ ）
- A. 静息电位减小
C. 钠通道数量减少
E. 阈电位水平抬高
28. 细胞内氧化代谢

- 舌前 2/3 味觉障碍伴泪腺分泌障碍，可能损伤的神经是（ ）
- A. 三叉神经
B. 4.9—5.5
C. 舌下神经
D. 肺通气和肺换气
29. 纯净胃液的 pH%（ ）
- A. 3.9—4.5
D. 2.9 — 3.5
30. 运动时产热量最大的器官是（ ）
- A. 皮肤
B. 骨骼肌
D. 肝脏
31. 卵巢动脉的起始部位是（ ）
- A. 髂内动脉
B. 腹主动脉
D. 子宫动脉
32. 正常时肾小球不能滤过的物质是（ ）
- A. 尿素
B. 氨基酸
D. 葡萄糖
33. 与组织液中含量基本相同的血浆成分是（ ）
- A. 球蛋白
B. 纤维蛋白原
D. 透明质酸
34. 光期引起视杆细胞膜发生的变化是（ ）
- A. 超极化
B. 极化
D. 去极化
35. 二尖瓣关闭不全典型的体征是（ ）
- A. 心尖部闻及收缩期吹风样高调杂音
B. 胸骨左缘第 2 肋间闻及 Graham Stell 杂音
C. 心尖部闻及舒张中期杂音
D. 胸骨左缘第 3 肋间闻及收缩期粗糙杂音
E. 胸骨左缘第 2 肋间闻及连续性杂音
36. 横断脑干网状结构使易化区活动占优势，其结果是（ ）
- A. 嗜睡
B. 昏迷
D. 柔软性麻痹
37. 测量血压时舒张压的判定为（ ）
- A. 听到声音变短促前的压力
C. 听到响亮拍击音时的压力
E. 声音消失时的压力

39. 自主神经节前纤维释放的递质是（

A.多巴胺 B.腺昔

D. 甘氨酸

40. 激素经血液循环被运行后作用于靶细胞的作用方式是（

A.远距分泌

D.旁分泌

C.0.9—1.5

E.1.9 ~2.5

C.心脏

E.大脑

C.髂外动脉

E.肾动脉

C.大分子蛋白质

E.电解质

C.清蛋白

E.电解质

C.反极化

E.复极化

）

C.去大脑僵直

E.意向性震颤

B.听到柔和吹风样杂音时的压力

D.拍击音重新出现时的压力

C.谷氨酸

E.乙酰胆碱

）

B.内在分泌

C.自分泌

E.神经分泌

睫

长
MIS
?

報

41. 下列关于皮质醇升高血糖机制的描述，正确的是（ ）
- A.减少细胞对葡萄糖的利用
B.增加外周组织摄取葡萄糖
C.使肝糖异生酶的活性降低
D.增加葡萄糖转运体的活性
E.减少肝糖异生原料的供应
42. 幼年期生长激素分泌过多最终可患的病症是（ ）
- A.侏儒症
B.呆小症
C.肢端肥大症
D.巨人症
E.向心性肥胖
43. 正常时激活膀胱壁牵张感受器的膀胱内尿量最小范围是（ ）
- A.200 ~300mL
B.800 ~900mL
C.600 ~700mL
D.400 ~500mL
E.1000—1100mL
44. 大量胸腔积液患者不易出现的体征是（ ）
- A.患侧闻及胸膜摩擦音
B.气管向健侧移位
C.患侧语音震颤减弱
D.患侧胸廓扩张度减弱
E.患侧肋间隙增宽
45. 男，45岁。因突发上腹痛并迅速向全腹蔓延3小时就诊。查体:T 38.8℃。全腹压痛及反跳痛阳性，肝浊音界消失。最可能的诊断是（ ）
- A.急性胃穿孔
B.急性胃肠炎
C.急性肠梗阻
D.急性胰腺炎
E.急性胆管炎
46. 对糖、脂肪和蛋白质均有消化作用的消化液是（ ）
- A.小肠液
B.胆汁
C.胃液
D.唾液
E.胰液
47. 无尿的定义是（ ）
- A.24小时尿量少于100mL
B.12小时尿量少于200mL
C.24小时尿量少于500mL
D.每小时尿量少于50mL
E.每小时尿量少于17mL
48. 可做向前和向后运动的关节是（ ）
- A.踝关节
B.肘关节
C.桡腕关节
D.肩关节
E.颞下颌关节
49. 预激综合征的心电图表现是（ ）
- A. PR间期正常, QRS增宽, 肢体导联QRS呈S型
B. PR间期缩短, QRS增宽, QRS起始部delta波
C. PR间期正常, QRS增宽, VsR增宽、顶峰粗钝
D. PR间期正常, QRS增宽, Vi、Vz导联QRS呈M型
E. P与QRS无关, QRS增宽, 房与室保持各自节律
- 50.阻塞性通气功能障碍患者肺功能改变的特点是（ ）
- A.一秒率降低
B.通气/血流比例失调
C.气速指数>1.0
D.残气量减少
E.肺活量增加

51. 某患者的检验报告如下，导致其发生猝死最可能的原因是（ ）
- A.血磷 0.8mmol/L
B.血钾 7.0mmol/L
C.血钠 158mmol/L
D.血氨 87fzmmol/L
E.血钙 19mmol/L

52. 交感缩血管神经节后纤维释放的神经递质是（ ）
- A.5—羟色胺
B.肾上腺素
C.P物质
D.乙酰胆碱
E.去甲肾上腺素

53. 甲状腺癌患者检查最常见的是（ ）
- A.甲状腺肿大可触及震颤
B.甲状腺多发结节伴触痛
C.甲状腺包块伴波动感
D.甲状腺包块不规则、质硬
E.甲状腺肿大并可触及颈动脉搏动

54. 引起肝颈静脉回流征阳性的常见病症是（ ）
- A.右心衰竭
B.下腔静脉阻塞
C.门脉高压症
D.左侧胸腔积液
E.肝功能衰竭

55. 男,40岁。发现高血压半年。查体时于脐部偏右上闻及血管杂音。最可能的诊断是（ ）
- A.主动脉夹层
B.原发性肝癌
C.缺血性肠病
D.门静脉血栓
E.肾动脉狭窄

56. 肺气肿患者可能出现的体征是（ ）
- A.双侧肋间隙变窄
B.肝上界下移
C.心界向两侧扩大
D.双肺语音震颤增强
E.肺部叩诊呈鼓音

57. 女,54岁。查体:肝脏于剑突下1.5cm可触及，质地如触口唇，无触痛。最可能的情况是（ ）
- A.肝左叶癌
B.慢性肝炎
C.正常肝脏
D.肝淤血
E.肝脓肿

58. 关于外科感染，叙述不正确的是（ ）
- A. 疖是指一个毛囊及其皮脂腺的化脓性感染
B. 急性蜂窝织炎是皮下、筋膜下蜂窝组织的化脓性感染
C. 脓性指头炎是指手指末节掌面皮下组织的化脓性感染
D. 痈是指多个不同部位散在的毛囊及其皮脂腺的化脓性感染
E. 甲沟炎是指甲沟及其周围组织的急性感染

59. 腹部移动性浊音不正确的检查方法是（ ）
- A.变换体位后继续原方向叩诊
B.叩诊音变浊音后改变体位
C.自腹中部沿脐水平面叩诊
D.变换体位时板指不应移动
E.受检者首先需采取平卧位

60. 易出现奇脉的病症是（ ）
- A.急性渗出性心包炎
B.多发性大动脉炎
C.低血容量性休克
D.左心衰竭
E.动脉导管未闭

61. Brudzinski 征阳性的表现是（ ）
A.趾背伸四趾屈曲 B.颈部抵抗增强 C.股四头肌收缩
D.伸膝受阻伴疼痛 E.髋关节及膝关节屈曲（ ）

62. 引起左锁骨上窝淋巴结肿大的常见病症是（ ）
A.骨髓炎 B.气管炎 C.结肠癌
E.食管癌
D.食管炎

A.肾功能 B.腹部 B 超
D.尿常规

64. 呼吸过程中肺内压最低值出现的时期是（ ）
A.呼气末 B.呼气中期 C.吸气初
D.吸气中期 E.吸气末

（ ）
C. 粪便常规
E.结肠镜 B.室上性心动过速

65. 某心悸患者查体所见：脉率 89 次/分，心率 113 次/分，心律绝对不齐。最可能的诊断 是（ ）
A.房性期前收缩 B.室上性心动过速 C, C.肝硬化腹水
心房颤动 E.自发性细菌性腹膜炎

C.皮肤和淋巴结多见化脓破溃
E.局部烧灼样疼痛
（ ）
D. B,12000mL C.14000mL
室颤动 E.18000mL

66. 女，32 岁。低热、盗汗、腹胀 2 个月。腹水检查结果：比重 1.018,蛋白 27 g/L,WBC 600X10⁶/L,L 0.55。普通细菌培养阴性。
A.结核性腹膜炎 B.化脓性腹膜炎
D.恶性腹水

67. 不属于丹毒临床表现的是（ ）
A.多见于下肢
B.畏寒、发热
D.头痛、全身不适
E.减少腹胀及尿潴留

68. 男，50 岁。体重 70kg。
B.纠正贫血

该患者体内的细胞外液量约为（ ）
A.16000mL
D.20000mL

69. 通常情况下，术后胃肠减压拔管的指征是（ ）
A.肛门排气后 B.无肠鸣音
D. 术后 3 天

70. 关于休克的一般紧急治疗，不正确的选项为（ ）
A.创伤制动、保证呼吸道通畅
C. 早期给予鼻导管或面罩吸氧
E. 注意保暖
C.胆囊静脉
E.附脐静脉

71. 关于术后早期活动，不正确的选项为（ ）
A.延缓切口愈合
D.改善血液循环
C.5%葡萄糖溶液
E.全血

72. 输血的目的不包括（ ）
A.杀灭细菌, 抗感染
C.改善凝血功能
E.提高血浆蛋白
B.确保循环功能稳定
D.防治肾功能衰竭

73. 符合诊断急性呼吸窘迫综合征指标的是（ ）
A.PaO₂/FiO₂^200mmHg
C. 胸片显示有广泛点、片状阴影
E.呼吸频率逐渐加快
C.左纵沟前部
E.横沟

74. 不属于肝门静脉属支的是（ ）
A.肝静脉 B.肠系膜上静脉
D. 脾静脉

75. 烧伤患者早期抗休克应先补充（ ）
A.电解质溶液 B.血浆
D. 10%葡萄糖溶液
B.急性心包炎
D.变异型心绞痛

76. 关于复苏后处理的原则，不正确的是（ ）
A.维持良好的呼吸功能
C. 持续应用抗菌药物
E. 防治脑水肿
B.有细菌存在, 并已发生感染的伤口 D. 腹股沟疝手术切口

77. 胆囊窝位于肝下面“H”形沟的部位是（ ）
A.右纵沟后部 B.右纵沟前部
D. 左纵沟后部

78. 有关输尿管的正确描述是（ ）
A.属于腹膜间位器官
C.开口于膀胱尖
E. 可分为腹段和盆段两部分

79. 某胸痛患者的心电图示：U、III、aVF 导联 ST 段抬高，T 波倒置，病理 Q 波形成。最可能的诊断是（ ）

- A.肥厚型梗阻性心肌病
C.急性心肌梗死
E.急性肺栓塞

80. 污染伤口是指 ()

- A.有细菌存在。但尚未发生感染的伤口
C.局部红肿并有分泌物的伤口
E.已化脓的伤口

81. 男, 31 岁。既往无心脏病史, 上班途中突发心悸、胸闷。心电图示 QRS 波形态与时限均正常, P 波为逆行性, 频率 220 次/分。该患者的诊断为 ()

- A.室上性心动过速
B.窦性心动过速
C.快速心房颤动
D.室性心动过速
E.快速心房扑动

82. 下列监测值中不正确的是（ ）
- A. CVP 的正常值为 5~12cmH₂O
- B. 心排血量的正常值为 4~6L/min
- C. PCWP 的正常值为 6~15cmH₂O
- D. 动脉血乳酸盐的正常值为：1~15mmol/L
- E. 血 pH 的正常范围为 7.35~7.45
83. 胸外心脏按压时，正确的按压部位是（ ）
- A.胸骨中、上 1/3 交界处
- B.胸骨左缘第 3 肋间
- C.胸骨左缘第 4 肋间
- D.左锁骨中线第 4 肋间
- E.胸骨中、下 1/3 交界处
84. 具有结肠带和肠脂垂的肠管是（ ）
- A.肛管
- B.直肠
- C.阑尾
- D.盲肠
- E.回肠
- | 得分 | 评卷人 |
|----|-----|
| | |
- 二、B 型题（85 — 108 小题，每小题 1.25 分，共 30 分。A、B、C、D、E 是其下两道小题的备选项。请从中选择一项最符合题目要求的，每个选项可以被选择一次或两次。）
85. 女,11 岁。发作性咳喘 3 年，加重 2 天。查体:双肺叩诊呈过清音，双肺可闻及高调干啰音。最可能的诊断是（ ）
- A.支气管哮喘
- B.大叶性肺炎
- C.张力性气胸
- D.急性肺水肿
- E.支气管炎
86. 男，60 岁。活动时喘憋半年，呼吸困难急性加重 4 小时就诊。查体:双肺满布湿啰音，心界扩大。最可能的诊断是（ ）
- A.肠系膜下动脉
- B.回结肠动脉
- C.髂内动脉
- D.右结肠动脉
- E.回肠动脉
87. 上述动脉中，发出直肠上动脉的是（ ）
88. 上述动脉中，发出阑尾动脉的是（ ）
- A.循环超负荷
- B.溶血反应
- C.发热反应
- D.过敏反应
- E.细菌污染反应
89. 发生性输血后 1~2 小时内，以后逐渐缓解的并发症是（ ）
90. 输入血型不合的血液时，发生的并发症是（ ）
- A.促进胃酸分泌
- B.刺激胰酶分泌
- C.刺激胰岛素分泌
- D.抑制胃肠上皮生长
- E.促进胃排空
91. 促胃液素的作用是（ ）
92. 缩胆囊素的作用是（ ）
- A.a 受体
- B.N 受体
- C.Di 受体
- D.（3 受体
- E.M 受体
93. 阿托品能阻断的受体是（ ）
94. 美托洛尔能阻断的受体是（ ）
- A.输精管腹股沟部
- B.尿道前列腺部
- C.输精管精索部

- D.尿道膜部
- E.尿道海绵体部
95. 射精管的开口部位是（ ）
96. 输精管结扎的常选部位是（ ）
- A.动脉导管未闭
- B.室间隔缺损
- C.主动脉瓣关闭不全
- D.肺动脉瓣狭窄
- E.三尖瓣狭窄
97. 男，7 岁。于胸骨左缘第 2 肋间闻及连续性粗糙杂音。最可能的诊断是（ ）
98. 女,72 岁。于胸骨左缘第 3 肋间闻及舒张期递减型叹气样杂音。最可能的诊断是（ ）
- A.肘关节
- B.桡腕关节
- C.肩关节
- D.踝关节
- E.髋关节
99. 可做背屈、跖屈运动的关节是（ ）
100. 可做旋前、旋后运动的关节是（ ）
- A.肝硬化失代偿期
- B.急性肝炎
- C.胆囊结石
- D.急性胆管炎
- E.急性肝脓肿
101. 女，55 岁。腹痛、寒战、高热 3 天。实验室检查:WBC 15X10⁹/L,N 0.88,Pit 350X 10⁹/L,血总胆红素 220/zmol/L,结合胆红素 200_Mmol/L。最可能的诊断是（ ）
102. 男，50 岁。腹胀、食欲减退半年。实验室检查：WBC 3.0X10⁹ / L,N 0.60,Plt 50X 10⁹/L,血总胆红素 45 amol/L,结合胆红素 20_Mmol/L。最可能的诊断是（ ）
- A.外周阻力
- B.心率
- C.大动脉弹性阻力
- D.重力
- E.每搏输出量
103. 影响收缩压的最主要因素是（ ）
104. 显著影响老年人脉压的因素是（ ）
- A.下垂部位明显，伴心界扩大
- B.从足部开始，伴皮脂减少
- C.从眼睑开始，伴高血压
- D.胫前黏液性水肿,伴腹泻
- E.腹部高度膨隆，伴低蛋白血症
105. 心源性水肿的特点是（ ）
- C.等渗性缺水
- E.低渗性缺水
106. 甲状腺功能亢进症可能出现的水肿是（ ）
- 呕吐，同时肛门停止排便、排气，尿量少，但无肠鸣音。诊断为急性肠梗阻。入院检查：眼窝凹陷、皮肤干燥、脉搏细速，BP 90/60mmHg。提示（ ）
- D.低钾血症
107. 男，50 岁。因反复发生肠绞痛手术并术后发生肠痿，每日消化液丢失约 1000mL。近日患者出现腹胀、恶心、呕吐、四肢无力。且腱反射消失，肠鸣音减弱。提示（ ）
- | 得分 | 评卷人 |
|----|-----|
| | |
- 三、X 型题（109 — 120 小题，每小题 1.25 分。共 15 分。在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案，多选或少选均不得分。）
109. 上肢较为恒定的浅静脉有（ ）
- A.桡静脉
- B.贵要静脉
- C.肱静脉

- D.头静脉
110. 参与骨盆构成的骨有（ ）
A.尾骨 B.耻骨 C.坐骨
D.髓骨 E.髌骨
111. 维持机体稳态的生理意义是（ ）
A.保证细胞的各种酶促生化反应 B.抑制条件反射和非条件反射
C.保证可兴奋细胞正常的兴奋性 D.使正反馈效应不断加强
E.是机体自由和独立生存的首要条件
112. 接受有效刺激后可产生动作电位的细胞是（ ）
A.脂肪细胞 B.部分腺细胞 C.红细胞
D.肌细胞 E.神经细胞
113. 住院病历中现病史的内容应包括（ ）
A.症状的性质 B.诊治经过 C.主要症状
114. 红细胞双凹圆碟形的形状改变可影响其功能特性的是（ ）
A.对促红细胞生成素的敏感性 B.叠连的速度
C.渗透脆性 D.表面抗原的类型
E.可塑性变形能力
115. 休克代偿期的临床表现有（ ）
A.皮肤、黏膜明显发绀 B.兴奋或烦躁不安
C.精神紧张 D.心率加快、脉压减小
E.尿少甚至无尿
116. 肠外营养所致的并发症有（ ）
A.腹胀 B.腹泻 C.低血糖
D.高脂血症
117. 能够引起胸痛的病症有（ ）
A.结核性胸膜炎 B.带状疱疹
C.胃食管反流病 D.食管憩室
118. 肾窦内含有的结构有（ ）
A.肾静脉的属支 B.肾大盏
C.肾盂 D.肾动脉的分支 E.肾盂
119. 肠内营养的制剂成分包括（ ）
A.维生素 B.脂肪
C.水 D.电解质
120. 能够听到支气管肺泡呼吸音的部位有（ ）
A.肩胛下区 B.肩胛间区
C.背部第 2 胸椎附近 D.肺尖前后部
E.诱发因素

- C.主动脉夹层肿瘤
- 睫
- 长
mis
?
- 報
- E.高血糖
- E.急性冠脉综合征
- C.肾小盏
- C. 蛋白质
E. 碳水化合物
)
- B.胸骨左侧第 1、2 肋间
D. 肩胛间区第 3 胸椎水平

三、X 型题

- | | | | | |
|----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 109.BD | 110.ABCDE | 111.ACE | 112.BDE | 113.ABCDE |
| 114.CE | 115.BCD | 116.CDE | 117.ABCDE | 118.ABCDE |
| 119.ABCD | 120.BDE | | | |

2020 年成人高等学校招生全国统一考试
医学综合（专升本）试题参考答案

一、A 型题

1.E	2.A	3.B	4.B	5.B	6.D	7.E	8.C	9.E	10.E
11.D	12.E	13.A	14.C	15.C	16.B	17.A	18.B	19.E	20.E
21.E	22.A	23.D	24.B	25.B	26.C	27.C	28.D	29.A	30.C
31.B	32.B	33.C	34.E	35.A	36.A	37.C	38.E	39.E	40.A
41.A	42.D	43.D	44.A	45.A	46.E	47.A	48.E	49.B	50.A
51.B	52.E	53.D	54.A	55.E	56.B	57.C	58.B	59.A	60.A
61.E	62.E	63.B	64.C	65.C	66.A	67.C	68.C	69.A	70.D
71.A	72.A	73.A	74.A	75.A	76.C	77.B	78.D	79.C	80.A
81.A	82.D	83.E	84.D						

二、B 型题

85.A	86.D	87.A	88.B	89.C	90.B	91.A	92.B	93.E	94.D
95.B	96.C	97.A	98.C	99.D	100.A	101.D	102.A	103.E	104.C
105.A	106.D	107.E	108.D						

2019 年成人高等学校招生全国统一考试
医学综合（专升本）试题

题号	一	二	三	总分
得分				

得分	评卷人

一、A 型题 (1~84 小题, 每小题 1.25 分。共 105 分。在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中, 请选出一项最符合题目要求的。)

1. 颈椎的特征性结构是（ ）
A.横突肋凹
B.横突
C.棘突较长
D.横突孔
E.上、下关节突
2. 防止胫骨前、后移位的韧带是（ ）
A.胫侧副韧带
B.腓侧副韧带
C.前交叉韧带
D.前、后交叉韧带
E.腓斜韧带
3. 通过膈食管裂孔的结构是（ ）
A.膈神经
B.胸导管
C.内脏大神经
D.迷走神经
E.内脏小神经
4. 食管的第二个狭窄距中切牙的距离大约是（ ）
A.15cm
B.35cm
C.25cm
D.40cm
E.45cm
5. 支气管镜检查时判断气管分叉的标志是（ ）
A.右主支气管
B.声门裂
C.气管隆嵴
D.前庭裂
E.膜壁
6. 位于肾门处的结构是（ ）
A.肾盂
B.肾大盏
C.肾小盏
D.肾柱
E.输尿管

7. 由四层腹膜构成的结构是 ()
- A.小网膜 B.小肠系膜 C.大网膜
D.阑尾系膜 E.乙状结肠系膜
8. A.子宫瓠韧带 B.子宫阔韧带
维持子宫颈正常位置,防止子宫脱垂的主要韧带是 ()
C.子宫圆韧带 D.子宫系膜
E.子宫主韧带
9. 卵子受精常见的部位是 ()
- A.输卵管壶腹部 B.输卵管漏斗部
C.输卵管峡部 D.输卵管壁内部
E.输卵管子宫部
10. 外耳门前方可摸到搏动的动脉是 ()
- A.舌动脉 B.颞浅动脉 C.面动脉
D.上颌动脉 E.甲状腺上动脉
11. 下列属于腹主动脉发出的成对的脏支是 ()
- A.卵巢动脉 B.脾动脉 C.膈下动脉
D.膈上动脉 E.腹腔干
12. 下列属于肝门静脉属支的是 ()
- A.肾静脉 B.肝静脉 C.卵巢静脉
D.肠系膜下静脉 E.膀胱静脉
13. 腹部不成对的淋巴干是 ()
- A.左腰干 B.右腰干
C.左支气管纵隔干 D.肠干
E.右支气管纵隔干
14. 沟通眼前房和眼后房的结构是 ()
- A.虹膜角膜角 B.巩膜静脉窦
C.泪点 D.瞳孔
E.前房角
15. 空气进入中耳鼓室要通过的结构是 ()
- A.外耳道 B.内耳道
C.乳突小房 D.鼻泪管
E.咽鼓管
16. 胃溃疡的好发部位是 ()
- A.幽门部 B.胃体前壁
C.胃大弯 D.贲门部
E.胃底
17. 属于脏胸膜的是 ()
- A.肺胸膜 B.膈胸膜
C.纵隔胸膜 D.肋胸膜
E.胸膜顶
18. 膀胱镜检查寻找输尿管口的标志是 ()
- A.输尿管 B.膀胱三角

- ： C.尿道内口 D.输尿管间壁
i E.膀胱壁
- ； 19. 精囊腺的位置是（ ）
； A.膀胱尖后方 B.膀胱体后方
i c.膀胱体前方 D.膀胱底前方
E.膀胱底后方
- ， 20.全身最粗大的脊神经是（ ）
： A.正中神经 B.尺神经
i c.坐骨神经 D.胫神经
； E.股神经
- ； 21. 损伤后可导致不能伸小腿、膝反射消失的神经是（ ）
； A.坐骨神经 B.胫神经 C.闭孔神经
i D.股神经 E.腓总神经
- ， 22. 最及时反映内环境理化性质变动情况的体液是（ ）
： A.脑脊液 B.尿液 C.血浆
： D.淋巴液 E.细胞内液
- 睫 23. 细胞膜去极化时，钠离子进入细胞内的方式属于（ ）
如 A.单纯扩散 B.泵转运
剛 C.载体介导的易化扩散 D.通道介导的易化扩散
柠 E.受体介导入胞
- 任 24. 红细胞发生叠连的主要原因是（ ）
牧 A.血浆球蛋白和纤维蛋白原增多 B.红细胞数量减少
加 C.血红蛋白浓度升高 D.血浆清蛋白和纤维蛋白增多
7 E.红细胞体积增大
- 心 25. 肝硬化患者易发生凝血功能障碍的主要原因是（ ）
■ A.白细胞数量减少 B.某些凝血因子的合成减少
； C.凝血因子对维生素 K 的依赖性减弱 D.血中抗凝物质浓度增加
； E.抗纤溶物质过度激活
- i 26. 心动周期中，心室内压大幅度升高的时期被称为（ ）
， A.等容舒张期 B.等容收缩期
： C.减慢射血期 D.快速充盈期
！ E.心房收缩期
- ！ 27. 生理情况下影响收缩压的主要变量是（ ）
； A.心率 B.外周阻力
； C.搏出量 D.血管容量
； E.动脉壁弹性
- ， 28. 当颈动脉窦压力感受器传入冲动增多时，引起的反射效应是（ ）
i A.心迷走神经紧张性减弱 B.心交感神经紧张性加强
C.副交感舒血管纤维紧张性减弱 D.交感缩血管纤维紧张性减弱
i E.肽类舒血管纤维紧张性减弱
- ； 29. 呼吸过程中，肺内压等于大气压的时期是（ ）
； A.吸气初 B.吸气中期 C.呼气初

- D.吸气末 E.呼气中期
30. 氧解离曲线右移的原因是（ ）
A.血液二氧化碳分压降低 B.组织温度降低
C.血红蛋白含量升高 D.红细胞内 2,3 —二磷酸甘油酸浓度降低
E.血液 pH 降低
31. 消化道集团蠕动发生的部位是（ ）
A.大肠 B.胃底和胃体 C.十二指肠
D.空肠和回肠 E.食管
32. 促胰液素的生理作用是（ ）
A.促小肠分泌大量黏液 B.降低胰液的 pH
C.促胰腺分泌大量水和碳酸氢盐 D.抑制缩胆囊素的作用
E.刺激胃酸分泌
33. 不适合测定基础代谢率的情况是（ ）
A.进少量流食 B.室温下进行
C.清晨 D.清醒时测定
E.平躺体位
34. 肥胖者天热更易出汗的主要原因是（ ）
A.体温调定点改变 B.散热面积与正常人明显不同
C.传导散热功能下降 D.不感蒸发功能减弱
E.汗腺数量明显多于正常人
35. 大量饮清水后尿量增多的原因主要是（ ）
A.血浆晶体渗透压降低 B.血浆胶体渗透压降低
C.肾小球滤过率增加 D.发生了定比重吸收
E.肾小管液晶体渗透压降低
36. 与葡萄糖重吸收密切相关的离子转运过程是（ ）
A.钙离子主动重吸收 B.钠离子主动重吸收
C.钾离子主动重吸收 D.氯离子被动重吸收
E.氢离子被动重吸收
37. 眼在视近物时发生的调节过程是（ ）
A.瞳孔散大 B.视轴倾斜
C.玻璃体向上下凸 D.晶状体向前后凸
E.视野变宽
38. 最有利于体内信息传递同步化的部位是（ ）
A.交感神经节后纤维与平滑肌细胞之间
B.自主神经节前纤维与节后神经元之间
C.神经—骨骼肌接头处
D.感觉传入纤维与中枢神经元之间
E.缝隙连接或电突触
39. 副交感神经节后纤维末梢释放的递质是（ ）
A.去甲肾上腺素 B.乙酰胆碱
C.5-羟色胺 D.谷氨酸
E.甘氨酸

:60. 典型急性左心衰竭痰液的性状是（ ）
i A.铁锈色痰 B.黄绿色痰 C.黄色脓痰
; D.粉红色泡沫痰 E.恶臭痰
; 61. 男，74 岁。剑突下不适、反酸 10 天，间断排黑色成形便 2 次。20 天前接受冠状动脉支
; 架术后行抗血小板治疗。导致上述症状最可能的原因是（ ）
A.胃癌 B.急性糜烂出血性胃炎
C. 反流性食管炎 D.十二指肠溃疡
: E.食管癌
! 62. 女,28 岁。上腹痛 3 天，发热 1 天就诊。查体：右下腹压痛及反跳痛阳性。血 WBC
; 15X10⁹/L,N 0.88,Pit 300X10⁹/L。最可能的诊断是（ ）
; A.宫外孕 B.肠结核 C.尿路感染
: D.胃穿孔 E.急性阑尾炎
63. 男，26 岁。自幼年起反复发作性喘憋，氨茶碱治疗有效。近 3 天上述症状再次出现。 查
体:双肺布满呼气相哮鸣音。该患者最可能的诊断是（ ）
A.慢性阻塞性肺疾病 B.肺炎链球菌肺炎
: C.气胸 D.支气管哮喘
睫 E.支气管扩张症
她 64. 胸腔积液中腺苷脱氨酶（ADA）明显升高常见于（ ）
剛 A.病毒感染 B.血胸 C.全心衰竭
柠 D.肺癌胸膜转移 E.结核性胸膜炎
任 65. 女,35 岁。高热、寒战伴尿急、尿频 2 天。右侧肾区叩击痛阳性。尿常规：尿蛋白（+
都 +）,白细胞满视野/HP,红细胞 10/HP。该患者最可能的诊断是（ ）
' A.急性肾小球肾炎 B.急性膀胱炎
£ C.急性肾盂肾炎 D.尿路结石
E.肾病综合征
: 66. 女,65 岁。饱餐后持续性上腹痛 5 小时，疼痛向腰背部放射，既往有胆石症病史。急
; 查血淀粉酶 438U/L。该患者最可能的诊断是（ ）
' A.急性心肌梗死 B.急性胃炎
; C. 急性肠梗阻 D.急性胰腺炎
E.急性胃穿孔
; 67. 动脉血气分析提示 I 型呼吸衰竭的是（ ）
; A.pHV7.35 B.PaCO₂ >50mmHg
: C. PaO₂<60mmHg D.BE 4.5
E.SaO₂>80%
; 68. 通常情况下，静脉补充钾盐时，每 500ml 液体中含钾不宜超过（ ）
: A.0.5g B.lg C.2g
: D.1.5g E.2.5g
69. 男，40 岁。呕吐胃内容物 1 月余，血 pH 7.5,血钾 3.0mmol/L,尿呈弱酸性。初步诊断 为（ ）

! A.呼吸性酸中毒)
; C.代谢性酸中毒 C.25 : 1
; E.呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒 E.30 : 1
70. 正常人血中 HCO_a 与 H₂CO₃之比是（
A.10： 1 B.15： 1 B.纠正贫血或低蛋白血症
D. 20 : 1 D.增加营养和供应能量
71. 关于输血的适应证，错误的是（
A.大出血时补充血容量 B.皮肤苍白
C.凝血异常补充各种凝血因子 D.四肢湿冷
E. 严重感染时输入补体、抗体
72. 各型休克的共同特点是（ ）
A.血压下降)
C.有效循环血量的急剧减少 B.中度烧伤，DI 度烧伤面积 10%～20%
E.烦躁不安 D.重度烧伤，DI 度烧伤面积 30%～40%
73. 有关烧伤程度的基本估计，正确的是（
A.轻度烧伤，n 度烧伤面积 5%以下)
C.中度烧伤，II 度烧伤面积 11%～30% B.应用糖皮质激素
E.特重烧伤，烧伤总面积 80%以上 D.及时吸氧
74. 术后肺不张的主要预防和治疗方法是（
A.应用广谱抗生素 C. 肾上腺素
C. 应用祛痰药 E.异丙肾上腺素
E.鼓励咳嗽和深呼吸)
75. 心肺复苏首选的)
药物是（ ） B.患指皮肤极度紧张
A.阿托品 B.去甲肾上腺素 D. 炎症一般不会蔓延到手掌间隙
D. 碳酸氢钠
76. 有关急性化脓性腱鞘炎的叙述，不正确的是（
A.患指中、近节均匀性肿胀
C.患指做被动伸指运动时疼痛加剧
E. 不及时切开减压肌腱可发生缺血
77. 有关术后发热的描述，正确的是（
A. 非感染性发热通常比感染性发热来得早
B. 约 90%的患者体温超过 37℃
C. 约 50 %患者体温超过 38℃ C.I/乙
D. 术后发热一定表示并发感染 E.n/ 乙
E. 发热不是最常见的症状)
78. 女,30 岁。因甲状腺腺瘤而手术，术后 5 天拆
线时切口已愈合，但颈前皮下有积液。
其切口愈合类型应记为（ ）
A.I/甲 B.I/丙
D. U/甲
79. 复苏后治疗中，保证一切措施奏效的先决条件 B.变形杆菌感染

- 是（
- A.应用糖皮质激素
 - C.循环功能的稳定
 - E. 预防感染

80. 特异性感染是指（）
- A.破伤风梭菌感染

- C.铜绿假单胞菌感染

E. 金黄色葡萄球菌感染
81. 破伤风患者的临床表现中，错误的是（ ）

A.抽搐时神志往往不清

B.抽搐时口吐白沫、面色发紺

C. 一般无高热

D.常引起尿潴留

E.肌肉收缩最初是嚼肌
82. 溶血性链球菌感染的特点中，错误的是（ ）

A.易扩散，缺乏局限化倾向

B.脓液稀薄

C.易导致败血症

D.是蜂窝织炎常见致病菌

E.常有转移性脓肿
83. 颅内海绵状静脉窦炎
83. 压颜面部“危险三角区”的疔肿容易并发（ ）

C.化脓性脑膜炎

E.脑脓肿
- C.9%X2

D.[9 + (12 - 年龄)]%
- E.9% + 年龄

得分	评卷人	二、B 型题（85～108 小题，每小题 1.25 分，共 30 分。A、B、C、D、E 是其下两道小题的备选项。请从中选择一项最符合题目要求的， 每个选项可以被选择一次或两次。）

- A.腮腺

B.前庭大腺

C.下颌下腺

D.舌下腺

E.甲状腺
85. 位于舌下装深面的是（ ）
86. 位于下颌骨体内面的是（ ）

A.听区

B.第 I 躯体感觉区

C.第 I 躯体运动区

D.运动性语言中枢

E.视区
87. 位于距状沟两侧皮质的是（ ）
88. 位于颞横回的是（ ）

A.眼神经

B.舌下神经

C.下颌神经

D.上颌神经

E.面神经
89. 穿颅底圆孔的神经是（ ）
90. 穿颅底卵圆孔的神经是（ ）

A.动作电位幅度下降

B.细胞膜迅速复极化

C.动作电位波形变宽

D.静息电位绝对增大

E.细胞膜去极化
91. 钠泵活动增强时可见（ ）
92. 用河豚毒（TTX）处理神经元后可见（ ）

A.菊粉

B.葡萄糖

C.抗利尿激素

D.甘露醇

E.碘锐特

84. 小儿头颈部烧伤应占体表面积百分数是（ ）

A.9%

B.12%
93. 可用于准确可靠地测定肾小球滤过率的物质是（ ）

C.甲状旁腺激素

E.甲状腺激素
94. 推测肾血浆流量可选择静脉注射的物质是（ ）

A.盐皮质激素

B.生长激素

D. 肾上腺素

B.胸骨左缘第 2 肋间连续性杂音

D.胸骨左缘第 3 肋间舒张期叹气样杂音
95. 对基础代谢率有明显影响的激素是（ ）
96. 升高血钙、降低血磷的激素是（ ）

A.胸骨右缘第 2 肋间收缩期喷射性杂音

C.咯血

C. 心尖区舒张期隆隆样杂音

E.意识障碍
100. 慢性阻塞性肺疾病合并细菌感染最突出的临床表现是（ ）

A.PaCO₂

B.PaO₂

C.pH

D.BE

E.SaO₂
101. 表示机体氢离子浓度的指
101. 心尖区收缩期吹风样杂音
97. 二尖瓣狭窄杂音的特点是（ ）

B.腰棘突突出的部位

D.第 3～4 腰棘突间隙
98. 主动脉瓣狭窄杂音的特点是（ ）

A. 口唇发紺

B.胸痛

D. 咳黄脓痰

C.8-9 日
99. 肺性脑病最突出的临床表现是（ ）

A.肩胛线第 7～8 肋间

C. 脐与左髂前上棘连线中外 1/3 交点处

E.髂前上棘后 1～2cm 处

C.乳头状疣
103. 常用的骨髓穿刺部位是（ ）

E.皮脂囊肿
104. 常用的腰椎穿刺部位是（ ）

A.6～7 日

B.4～5

D. 13—14 日
105. 下肢手术后拆线时间是（ ）
106. 颈部手术后拆线时间是（ ）
109. 下列属于腹膜间位器官的有（ ）

A.肝

B.乙状结肠

C.子宫

D.降结肠

E.升结肠
- 110.属于男性生殖附属腺的结构有（ ）

A.精囊腺

B.前列腺

C.尿道球腺

D.附睾

E.输精管

- A.毛细血管瘤
- B.神经纤维瘤
- D.脂肪瘤

107. 常对称生长，沿神经干分布多发，可夹杂脂肪、毛细血管的肿瘤是（ ）

108. 呈分叶状、质软而有假囊性感的
是（ ）

三、X 型题（109—120 小题，每小题 1.25 分，共 15 分。在每小题给 出的 A、B、C、D、E 五个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案，多选或少选均不得分。）

K- 報	111. 上腔静脉的直接属支有（ ）	A.左头臂静脉 D.左颈内静脉	B.右头臂静脉 E.右锁骨下静脉	C.头静脉 E.右锁骨下静脉
	112. 正常血浆中不存在的物质有（ ）	A.纤维蛋白多聚体 D.钙离子	B.二氧化碳	C.钠离子 E.凝血因子 m
	113. 能产生快反应动作电位的心脏细胞有（ ）	A.心房肌细胞 D.房室结细胞	B.心室肌细胞	c.窦房结细胞 E.浦肯野细胞
	114. 脊休克动物的主要表现有（ ）	A.血压下降 C.骨骼肌紧张性减弱 E.呼吸停止		B.粪尿积聚 D.发汗反射消失
	115. 男，68 岁。在社区医疗机构测血压为：160/40mmHg。出现的体征有（ ）	A.水冲脉 C.奇脉 E.枪击音		B.交替脉 D.毛细血管搏动征
	116. 脑膜刺激征包括（ ）	A.颈强直 C.Brudzinski 征阳性 E.Kernig 征阳性		B.Babinski 征阳性 D.Hoffmann 征阳性
	117. 问诊现病史的主要内容包括（ ）	A.起病情况及时间 C.主要症状的特点 E.病情演变及诊治经过		B.病因或诱因 D.伴随症状
	118. 代谢性酸中毒的主要病因有（ ）	A.胃液丧失过多 C.酸性物质产生过多 E.肾功能不全		B.碱性物质丢失过多 D.利尿剂的作用
	119. 常用的血液成分制品包括（ ）	A.红细胞制品 D.新鲜冰冻血浆	B.冷沉淀	C.血小板制剂 E.右旋糖酐
	120. 机体处于应激如创伤、手术、感染等情况下，能量代谢的变化包括（ ）	A.机体出现分解代谢 C.蛋白质分解加速 E.机体处于负氮平衡		B.脂肪分解加速 D.常出现低血糖

2019 年成人高等学校招生全国统一考试 医学综合（专升本）试题参考答案

一、A 型题

1.D	2.D	3.D	4.C	5.C	6.A	7.C	8.E	9.A	10.B
11.A	12.D	13.D	14.D	15.E	16.A	17.A	18.D	19.E	20.C
21.D	22.C	23.D	24.A	25.B	26.B	27.C	28.D	29.D	30.E
31.A	32.C	33.A	34.C	35.A	36.B	37.D	38.E	39.B	40.A
41.B	42.D	43.B	44.D	45.A	46.C	47.D	48.C	49.A	50.D
51.A	52.E	53.E	54.E	55.A	56.D	57.D	58.E	59.B	60.D
61.B	62.E	63.D	64.E	65.C	66.D	67.C	68.D	69.D	70.D
71.D	72.C	73.C	74.E	75.C	76.D	77.A	78.C	79.D	80.A
81.A	82.E	83.A	84.D						

二、B 型题

85.D	86.C	87.E	88.A	89.D	90.C	91.D	92.A	93.A	94.E
95.E	96.C	97.C	98.A	99.E	100.D	101.C	102.D	103.E	
104.D	105.E	106.B	107.B	108.D					

三、X 型题

109.ACDE	110.ABC	111.AB	112.AE	113.ABE	114.ABD
115.ADE	116.ACE	117.ABCDE	118.BCE	119.ABCD	120.ABCE