

# 高等学历-医学综合（试卷）



类目：高等学历继续教育模拟试卷

书名：高等学历-医学综合（试卷）

主编：陈智秀

出版社：河北科学技术出版社

开本：正 16 开

书号：978-7-5717-1202-0

使用层次：成人教育

出版时间：2022 年 11 月

定价：26.00 元

印刷方式：单色

是否有资源：是

## 图书同步精讲课程

—课时多、讲得细、学得快，通过考试更容易—

提升学历就选高等学历继续教育



理论精讲

明确考情  
夯实基础



真题讲练

掌握规律  
巩固提升



专题突破

把握重点  
突破难点



模考训练

模考强化  
标准预测

### 课程说明

本课程视频由一线教师录制。

本课程与最新考试大纲配套。

本课程的学习平台为小书恋学习公众号，扫描右侧二维码观看。

立即扫码



小书恋学习公众号

全国各类高等学历继续教育招生考试备考用书（专科起点升本科）

### 教材系列

- |                            |                             |                               |                               |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="radio"/> 政治   | <input type="radio"/> 英语    | <input type="radio"/> 高等数学（一） | <input type="radio"/> 高等数学（二） |
| <input type="radio"/> 民法   | <input type="radio"/> 教育理论  | <input type="radio"/> 医学综合    | <input type="radio"/> 大学语文    |
| <input type="radio"/> 艺术概论 | <input type="radio"/> 生态学基础 |                               |                               |

### 试卷系列

- |                            |                             |                                       |                               |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="radio"/> 政治   | <input type="radio"/> 英语    | <input type="radio"/> 高等数学（一）         | <input type="radio"/> 高等数学（二） |
| <input type="radio"/> 民法   | <input type="radio"/> 教育理论  | <input checked="" type="radio"/> 医学综合 | <input type="radio"/> 大学语文    |
| <input type="radio"/> 艺术概论 | <input type="radio"/> 生态学基础 |                                       |                               |

责任编辑：王文静  
责任校对：李蔚蔚  
美术编辑：张 帆

ISBN 978-7-5717-1202-0



定价：26.00元

全国各类高等学历继续教育招生考试真题汇编及全真模拟

医学综合

专科起点升本科

主编 陈智秀

河北科学技术出版社

全国各类高等学历继续教育招生考试真题汇编及全真模拟

全国百所继续教育机构推荐用书

· 全新版 ·



# 医学综合

专科起点升本科

主编 陈智秀

✓ 重点讲解

✓ 视频课程

✓ 强化训练

✓ 全新真题



河北科学技术出版社

目 录



图书在版编目(CIP)数据

医学综合：专科起点升本科 / 陈智秀主编. —石  
家庄：河北科学技术出版社，2022.9(2025.1重印)  
全国各类高等学历继续教育招生考试真题汇编及全真  
模拟 / 张东红主编  
ISBN 978-7-5717-1202-0

I. ①医… II. ①陈… III. ①医学—成人高等教育—  
习题集—升学参考资料 IV. ①R—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2022)第 156611 号

医学综合 专科起点升本科

YIXUE ZONGHE ZHUANKE QIDIAN SHENG BENKE  
主编 陈智秀

出版发行 河北科学技术出版社  
地 址 石家庄市友谊北大街 330 号(邮编:050061)  
印 刷 唐山唐文印刷有限公司  
开 本 787 毫米×1092 毫米 1/8  
印 张 6  
字 数 150 千字  
版 次 2022 年 9 月第 1 版  
印 次 2025 年 1 月第 3 次印刷  
定 价 20.00 元

2024 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合(专升本)试题 ..... (1-10)

2024 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合(专升本)试题参考答案 ..... (11-12)

2023 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合(专升本)试题 ..... (1-10)

2023 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合(专升本)试题参考答案 ..... (11)

2022 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合(专升本)试题 ..... (1-10)

2022 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合(专升本)试题参考答案 ..... (11)

2021 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合(专升本)试题 ..... (1-11)

2021 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合(专升本)试题参考答案 ..... (12)

2020 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合(专升本)试题 ..... (1-11)

2020 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合(专升本)试题参考答案 ..... (12)

2019 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合(专升本)试题 ..... (1-11)

2019 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合(专升本)试题参考答案 ..... (12)

2018 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合(专升本)试题 ..... (1-11)

2018 年成人高等学校招生全国统一考试医学综合(专升本)试题参考答案 ..... (12)

医学综合全真模拟试卷 ..... (1-11)

医学综合全真模拟试卷参考答案 ..... (12)

2024 年成人高等学校招生全国统一考试  
医学综合(专升本)试题

|    |   |   |   |    |
|----|---|---|---|----|
| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
| 得分 |   |   |   |    |

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 评卷人 |
|    |     |

一、A 型题(1~44 小题,每小题 1.5 分;45~54 小题,每小题 2 分;共 86 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中,请选出一项最符合题目要求的。)

1. 椎体向上伸出齿突的椎骨是( )  
A. 第一颈椎  
B. 第二颈椎  
C. 第三颈椎  
D. 第一胸椎
2. 关于颏舌肌作用的叙述,正确的是( )  
A. 一侧收缩,舌尖伸向同侧  
B. 双侧收缩,舌缩向后  
C. 左侧颏舌肌瘫痪,伸舌时舌尖偏向左  
D. 左侧颏舌肌瘫痪,伸舌时舌尖偏向右
3. 咽鼓管咽口的开口部位是( )  
A. 鼻咽部侧壁  
B. 口咽部侧壁  
C. 喉咽部侧壁  
D. 喉口两侧
4. 胃的角切迹所在的位置是( )  
A. 胃大弯的最低处  
B. 胃小弯的最低处  
C. 幽门与十二指肠交界处  
D. 胃底与胃体交界处
5. 阴道后穹穿刺抽取腹膜腔积液,针尖抵达的部位是( )  
A. 直肠膀胱陷凹  
B. 直肠子宫陷凹  
C. 膀胱子宫陷凹  
D. 膀胱上窝

6. 输卵管结扎的常选部位是( )  
A. 峡部  
B. 壶腹部  
C. 漏斗部  
D. 子宫部
7. 左心室流出道出口处的瓣膜是( )  
A. 二尖瓣  
B. 三尖瓣  
C. 主动脉瓣  
D. 肺动脉瓣
8. 下列属于升主动脉分支的是( )  
A. 头臂干  
B. 左颈总动脉  
C. 左锁骨下动脉  
D. 左、右冠状动脉
9. 汇合形成上腔静脉的是( )  
A. 左、右颈内静脉  
B. 左、右头臂静脉  
C. 左、右锁骨下静脉  
D. 左、右头静脉
10. 损伤后可出现“爪形手”的是( )  
A. 正中神经  
B. 尺神经  
C. 肌皮神经  
D. 桡神经
11. 从脑干背侧出脑的脑神经是( )  
A. 动眼神经  
B. 舌下神经  
C. 滑车神经  
D. 副神经
12. 神经调节的基本方式是( )  
A. 反射  
B. 反馈  
C. 反应  
D. 适应
13. 运动神经末梢在神经—骨骼肌接头处释放的递质是( )  
A. 多巴胺  
B. 谷氨酸  
C. 乙酰胆碱  
D. 肾上腺素
14. 临床上输血的原则是( )  
A. O 型血可大量、快速输给其他血型的患者  
B. AB 血型的患者可大量、快速接受其他血型的血液  
C. ABO 血型相符的患者在输血前不必做交叉配血试验  
D. 交叉配血试验主侧和次侧中,需两侧均不凝集时方可输血



15. 窦房结能作为心脏起搏点的主要原因是( )
- A. 0 期去极化的速度快  
B. 1 期复极化的速度快  
C. 兴奋性较高  
D. 4 期自动去极化的速度快
16. 使中心静脉压升高的情况是( )
- A. 使用利尿剂后  
B. 失血性休克  
C. 使用强心药后  
D. 右心衰竭
17. 影响气道阻力最重要的因素是( )
- A. 气道的口径  
B. 气道的长度  
C. 气流的形式  
D. 气流的速度
18. 根据氧解离曲线,正常人血氧分压在 60mmHg 以上时的血氧饱和度范围是( )
- A. 60%~70%  
B. 71%~80%  
C. 81%~90%  
D. >90%
19. 长期缺乏可导致夜盲症的是( )
- A. 维生素 A  
B. 维生素 B  
C. 维生素 C  
D. 维生素 D
20. 在对有机磷中毒患者的治疗中,阿托品不能改善的症状是( )
- A. 肠痉挛  
B. 瞳孔缩小  
C. 心率减慢  
D. 骨骼肌颤动
21. 内脏痛最主要的特点是( )
- A. 发起迅速  
B. 终止迅速  
C. 定位不明确  
D. 不引起情绪活动
22. 关于雌激素生理作用的叙述,正确的是( )
- A. 协同 FSH 促进卵泡发育  
B. 促进子宫内膜分泌  
C. 抑制输卵管运动  
D. 使阴道分泌物呈碱性
23. 引起喷射性呕吐的常见疾病是( )
- A. 胃溃疡  
B. 肠梗阻  
C. 急性肝炎  
D. 脑膜炎
24. 黏液性水肿面容常见的病症是( )
- A. 慢性肾炎  
B. 肝硬化  
C. 慢性心力衰竭  
D. 甲状腺功能减退症
25. 女,38 岁。自觉劳累后出现咳嗽、盗汗 2 个月,“头孢类”抗菌药物治疗无效。近 1 周咯血,发病以来体重减轻 3kg。查体:T 37.8℃,双肺未闻及干湿啰音。胸部 X 线片检查

- 示:右上肺斑片状阴影,边界不清。应首先考虑的疾病是( )
- A. 支气管扩张症  
B. 肺癌  
C. 肺炎  
D. 肺结核
26. 蜘蛛痣不常出现的部位是( )
- A. 颜面部  
B. 颈部  
C. 腹部  
D. 前胸部
27. 男,55 岁。口干、多尿、体重减轻半年。3 年前发现血脂异常。应首先进行的实验室检查是( )
- A. 空腹血糖  
B. 肿瘤标志物  
C. 血电解质  
D. 甲状腺激素
28. 出现奇脉,常见的病症是( )
- A. 大量心包积液  
B. 左心衰竭  
C. 二尖瓣狭窄  
D. 二尖瓣关闭不全
29. 女,41 岁。腹胀、呕吐隔夜宿食 1 周。查体:腹部可见胃型,振水音(+),肝脾未触及。可能的诊断是( )
- A. 急性胃炎  
B. 幽门梗阻  
C. 急性胰腺炎  
D. 急性胆囊炎
30. 右侧大量气胸可能出现的阳性体征是( )
- A. 右侧胸廓凹陷  
B. 右侧肺部叩诊鼓音  
C. 气管向右侧移位  
D. 右侧肺部语音震颤增强
31. 男,68 岁。脑血管病康复治疗 1 个月。查体:右下肢能抬离床面,但不能抗阻力。其肌力为( )
- A. 0 级  
B. 1 级  
C. 2 级  
D. 3 级
32. 肺功能检查中 FEV<sub>1</sub>/FVC 主要反映的是( )
- A. 通气功能  
B. 换气功能  
C. 肺泡弥散功能  
D. 小气道功能
33. 女,67 岁。就诊主诉:间断胸痛半年。现病史采集的内容不包括( )
- A. 胸痛的诱因  
B. 父母有无类似发病  
C. 胸痛的部位和性质  
D. 加重和缓解因素

34. 细胞外液中最主要的阳离子是( )
- A.  $K^{+}$  B.  $Mg^{2+}$   
C.  $Ca^{2+}$  D.  $Na^{+}$
35. 关于肿瘤的叙述,不正确的是( )
- A. 根据生物学行为特点,分为良性和恶性  
B. 良性肿瘤均无明显症状  
C. 来源于上皮组织的恶性肿瘤称为“癌”  
D. 来源于间叶组织的恶性肿瘤称为“肉瘤”
36. 成人无尿是指 24 小时尿量( )
- A. 0ml B. <100ml  
C. <150ml D. <200ml
37. 下列不属于肾前性肾功能不全的原因是( )
- A. 大量出血 B. 使用肾毒性药物  
C. 严重脱水 D. 心排血量下降
38. 关于破伤风的叙述,错误的是( )
- A. 致病菌为破伤风梭菌  
B. 潜伏期通常为 7~8 天  
C. 注射破伤风抗毒素属主动免疫  
D. 正确处理伤口对于预防破伤风有重要作用
39. 下列不属于低血容量性休克的表现是( )
- A. 中心静脉压降低 B. 血管阻力降低  
C. 回心血量减少 D. 心率加快
40. 能造成肾后性肾功能不全的病因是( )
- A. 广泛烧伤 B. 严重挤压伤  
C. 双侧输尿管结石 D. 感染性休克
41. 男,62 岁。糖尿病病史 10 年,口服二甲双胍控制血糖,拟行结肠癌根治术。血糖控制的原则是( )
- A. 无须特殊处理 B. 输含糖液时不使用胰岛素  
C. 血糖控制在 5.6~11.2mmol/L 为宜 D. 术前改为长效胰岛素皮下注射
42. 关于休克的叙述,错误的是( )
- A. 有效循环血量锐减和组织灌注不足是其病理生理基础

- B. 迅速失血达到血液总量的 10%即发生休克  
C. 收缩压<90mmHg 是休克的重要临床表现  
D. 脉率变化多出现在血压下降之前
43. 心肺复苏时,胸外心脏按压的深度是( )
- A. 1~2cm B. 2~3cm  
C. 3~4cm D. 5~6cm
44. 感染性休克的治疗原则是( )
- A. 优先处理感染,然后纠正休克 B. 着重纠正休克,同时治疗感染  
C. 腹腔感染首选大环内酯类抗生素 D. 禁用糖皮质激素

(45~47 题共用题干)

- 女,46 岁。进油腻食物后出现阵发性右上腹绞痛,向右肩背部放射 1 周,症状加重伴发热 2 小时就诊。1 年前曾诊断为胆石症,未治疗。
45. 该患者最可能出现的体征是( )
- A. 麦氏点压痛及反跳痛 B. 叩诊肺肝界消失  
C. 右肾区叩痛阳性 D. 墨菲征阳性
46. 首先考虑的诊断是( )
- A. 胃溃疡并穿孔 B. 急性胆囊炎  
C. 急性阑尾炎 D. 右输尿管结石
47. 对该患者诊断最有意义的辅助检查是( )
- A. 腹部 B 超 B. 尿常规  
C. 血常规 D. 立位腹平片

(48~50 题共用题干)

- 男,19 岁。鼻塞,流涕,咳嗽 1 周,突发喘息及呼吸困难 3 小时就诊。既往过敏性鼻炎病史。
48. 肺部听诊最可能的表现是( )
- A. 右侧肺湿啰音 B. 双肺满布呼气性哮鸣音  
C. 双下肺湿啰音 D. 右侧呼吸音减低
49. 应首先考虑的疾病是( )
- A. 急性喉炎 B. 急性左心衰竭  
C. 支气管哮喘 D. 肺炎球菌肺炎

50. 对诊断最有意义的辅助检查是( )

- A. 肺功能
- B. 超声心动图
- C. 咽喉镜
- D. 胸部 X 线平片

(51~52 题共用题干)

男,42 岁。因反复呕吐 5 天入院,呕吐物为隔夜宿食。否认糖尿病病史。查血压 85/45mmHg,血  $\text{Na}^+$  118mmol/L,心电图示 T 波低平。

51. 患者水、钠代谢紊乱的类型是( )

- A. 低渗性脱水
- B. 等渗性脱水
- C. 高渗性脱水
- D. 水中毒

52. 下列优先选择的液体是( )

- A. 10%葡萄糖液
- B. 5%葡萄糖氯化钠液
- C. 10%氯化钠液
- D. 10%葡萄糖液+15%氯化钾液

(53~54 题共用题干)

男,26 岁。右大腿和右小腿被烫伤,局部肿胀发红,伴有水疱,创面红润,疼痛明显。

53. 该患者烧伤面积和深度是( )

- A. 23%,浅Ⅱ度
- B. 23%,深Ⅱ度
- C. 17%,浅Ⅱ度
- D. 17%,深Ⅱ度

54. 该患者属于( )

- A. 轻度烧伤
- B. 中度烧伤
- C. 重度烧伤
- D. 特重烧伤

| 得 分 | 评卷人 |
|-----|-----|
|     |     |

**二、B 型题**(55~70 小题,每小题 1.5 分,共 24 分。A、B、C、D 是其下两道小题的备选项,请从中选择一项最符合题目要求的,每个选项可以被选择一次或两次。)

- A. 臀大肌
- B. 股四头肌
- C. 股二头肌
- D. 腓肠肌

55. 收缩时,可屈髋关节、伸膝关节的肌是( )

56. 收缩时,可使髋关节伸和旋外的肌是( )

- A. 肾小盏
- B. 肾大盏
- C. 肾盂
- D. 输尿管

57. 包绕肾乳头的漏斗状短管是( )

58. 走出肾门的结构是( )

- A. 胃酸
- B. 内因子
- C. 肠激酶
- D. 碳酸氢盐

59. 能使胃蛋白酶原活化为胃蛋白酶的物质是( )

60. 能使胰蛋白酶原活化为胰蛋白酶的物质是( )

- A. 近端小管
- B. 髓袢降支细段
- C. 髓袢升支细段
- D. 远曲小管和集合管

61. 发生球—管平衡的部位是( )

62. 肾小管液重吸收和分泌的体液调节部位是( )

- A.  $\text{PaO}_2$
- B.  $\text{SaO}_2$
- C. BE
- D.  $\text{PaCO}_2$

63. 反映动脉血氧与血红蛋白结合程度的指标是( )

64. 反映机体碱储备的重要指标是( )

- A. 左腋窝淋巴结
- B. 右腋窝淋巴结
- C. 左锁骨上淋巴结
- D. 全身表浅淋巴结

65. 胃癌淋巴结转移的常见部位是( )

66. 艾滋病淋巴结肿大的常见部位是( )

- A. 浓缩红细胞
- B. 白蛋白
- C. 新鲜冰冻血浆
- D. 免疫球蛋白

67. 纠正凝血因子缺乏症首选的血液制品是( )

68. 纠正重度贫血首选的血液制品是( )

- A. 口服肠内营养
- B. 鼻胃管肠内营养
- C. 经中心静脉肠外营养
- D. 经周围静脉肠外营养

69. 腹部手术胃肠功能已恢复患者的营养方案是( )

70. 严重短肠综合征患者的长期营养方案是( )

| 得 分 | 评卷人 |
|-----|-----|
|     |     |

**三、X 型题**(71~90 小题,每小题 2 分,共 40 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中,至少有两项是符合题目要求的,请选出所有符合题目要求的答案,多选或少选均不得分。)

71. 两侧颞下颌关节联合运动,可使下颌骨产生的运动有( )

- A. 上提
- B. 下降
- C. 前进
- D. 后退

72. 下列属于小肠的结构有( )

- A. 十二指肠  
B. 空肠  
C. 回肠  
D. 盲肠

73. 小脑的功能有( )

- A. 维持人体平衡  
B. 调节肌张力  
C. 协调随意运动  
D. 调节内分泌活动的中枢

74. 下列属于眼球折(屈)光装置的有( )

- A. 角膜  
B. 瞳孔  
C. 房水  
D. 晶状体

75. 下列属于一般内脏运动核的脑神经核有( )

- A. 动眼神经副核  
B. 上泌涎核  
C. 下泌涎核  
D. 迷走神经背核

76.  $K^+$  跨细胞膜转运的方式有( )

- A. 单纯扩散  
B. 经通道易化扩散  
C. 主动转运  
D. 入胞作用

77. 冠脉循环的生理特点有( )

- A. 血压较高,血流量大  
B. 摄氧率高,耗氧量大  
C. 受心肌收缩影响显著  
D. 心率加快时血流量增加

78. 化学性突触传递的特点有( )

- A. 双向传递  
B. 时间延搁  
C. 兴奋节律不变  
D. 兴奋发生总和

79. 机体主要的产热器官有( )

- A. 血管  
B. 肝脏  
C. 骨骼  
D. 骨骼肌

80. 由腺垂体释放的激素有( )

- A. 催乳素  
B. 促甲状腺激素  
C. 血管升压素  
D. 促肾上腺皮质激素

81. 评价皮肤弹性常用的检查部位有( )

- A. 手背  
B. 前臂  
C. 胫骨前  
D. 上臂内侧

82. 胸骨角的临床及解剖意义包括( )

- A. 计数肋骨和肋间隙  
B. 标志支气管分叉的水平  
C. 相当于第 5 胸椎的水平  
D. 标志上、下纵隔交界的水平

83. 判断巨脾的标准有( )

- A. 脾缘肋下 2cm 可触及  
B. 脾缘超过前正中线  
C. 脾缘肋下 3cm 可触及  
D. 脾缘超过脐水平线

84. 以胸骨左缘第 2 肋间收缩期杂音为主要表现的病变有( )

- A. 主动脉瓣狭窄                      B. 肺动脉瓣狭窄  
C. 房间隔缺损                        D. 室间隔缺损

85. 下列属于支气管镜检查适应证的有( )

- A. 严重肺功能不全  
B. 不明原因咯血  
C. 不明原因肺不张  
D. X 线胸片示肺团块影

86. 关于 TNM 分期的叙述,正确的有( )

- A. T 为原发性肿瘤, N 为淋巴结, M 为远处转移
- B. 可用于判断肿瘤预后
- C. 临床无法判断肿瘤体积时以  $T_0$  表示
- D. 包括临床分期和术后病理分期

87.可引起特异性感染的病原菌有( )

- A. 结核杆菌  
B. 念珠菌  
C. 破伤风梭菌  
D. 铜绿假单胞菌

88. 下列属于择期手术的有( )

- A. 甲状腺腺瘤行腺叶切除术  
B. 右侧腹股沟疝修补术  
C. 急性化脓性胆囊炎行胆囊切除术  
D. 结肠癌行结肠癌根治术

89. 可通过输血途径传播的病原体有( )

- A. 丙型肝炎病毒  
B. 梅毒螺旋体  
C. 疟原虫  
D. HIV

90. 需要预防性应用抗生素的手术有( )

- A. 膝关节置换术  
B. 心脏瓣膜置换术  
C. 甲状腺腺瘤切除术  
D. 结肠癌根治术



2024 年成人高等学校招生全国统一考试  
医学综合(专升本)试题参考答案

一、A 型题

1. B    2. C    3. A    4. B    5. B    6. A    7. C    8. D    9. B    10. B  
11. C    12. A    13. C    14. D    15. D    16. D    17. A    18. D    19. A    20. D  
21. C    22. A    23. D    24. D    25. D    26. C    27. A    28. A    29. B    30. B  
31. D    32. A    33. B    34. D    35. B    36. B    37. B    38. C    39. B    40. C  
41. C    42. B    43. D    44. B    45. D    46. B    47. A    48. B    49. C    50. A  
51. A    52. B    53. C    54. B

二、B 型题

55. B    56. A    57. A    58. C    59. A    60. C    61. A    62. D    63. B    64. C  
65. C    66. D    67. C    68. A    69. A    70. C

三、X 型题

71. ABCD

【解析】下颌关节允许下颌进行上提、下降、前进、后退及侧方运动。

72. ABC

【解析】小肠是消化管中最长的一段,在成人长 5~7m。上端起于胃幽门,下端接续盲肠,分为十二指肠、空肠和回肠 3 部。

73. ABC

【解析】前庭小脑(原小脑)的主要作用为调节躯干肌运动、协调眼球运动以及维持身体平衡。脊髓小脑(旧小脑)主要调节肌张力。大脑小脑(新小脑)主要调控骨骼肌的随意、精细运动。

74. ACD

【解析】角膜的曲度较大,外凸内凹,具有屈光作用。房水为无色透明的液体,充填于眼房内,具有一定的屈光力。晶状体是眼屈光系统的主要装置,其曲度随所视物体的远近不同而改变。瞳孔主要的功能是调节进入眼内的光量,不属于屈光装置。

75. ABCD

【解析】一般内脏运动核包括动眼神经副核、上泌涎核、下泌涎核、迷走神经背核。

76. BC

【解析】K<sup>+</sup>跨细胞膜转运的方式有经通道易化扩散和主动转运。细胞的细胞膜上有多 种离子通道,其中包括钾离子通道。这些通道蛋白为 K<sup>+</sup>的跨膜转运提供了途径。离子 通道具有选择性,钾离子通道允许 K<sup>+</sup>顺着浓度梯度进行跨膜扩散。细胞内的 K<sup>+</sup>能够 保持较高的浓度主要依靠钠-钾泵(Na<sup>+</sup>-K<sup>+</sup>-ATP 酶)的主动转运。

77. ABC

【解析】冠脉循环的生理特点:血压较高,血流量大;摄氧率高,耗氧量大;血流量受心肌 收缩的影响显著。当心率加快时,由于心舒期明显缩短,因而冠脉血流量减少。

78. BD

【解析】突触传递的特点:单向传播;中枢延搁;兴奋的总和;兴奋节律的改变;后发放;对 内外环境变化敏感和易疲劳。

79. BD

【解析】人体主要的产热器官是肝脏和骨骼肌。在安静时肝脏是主要的产热器官,在运 动时骨骼肌是主要的产热器官。

80. ABD

【解析】腺垂体是体内最重要的内分泌腺,腺垂体可分泌 7 种激素,包括促甲状腺激素 (TSH)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、促卵泡激素(FSH)、黄体生成素(LH)、生长激素 (GH)、催乳素(PRL)及促黑素细胞激素(MSH)。血管升压素属于神经垂体激素。

81. AD

【解析】皮肤弹性检查的方法为选取双侧手背或上臂内侧皮肤,用拇指和示指将皮肤捏 成褶皱状提起,然后迅速松手,松手后若皮肤褶皱迅速恢复正常,则说明皮肤弹性正常。

82. ABCD

【解析】胸骨角由胸骨柄与胸骨体的连接处向前突起而成,其两侧分别与左右第 2 肋软 骨连接,为计数肋骨和肋间隙顺序的主要标志;标志支气管分叉、心房上缘和上下纵隔 交界;相当于第 4 或第 5 胸椎的水平。

83. BD

【解析】脾缘超过脐水平线或前正中线,即为巨脾。

84. BC

【解析】肺动脉瓣狭窄听诊可在胸骨左缘第 2 肋间闻及响亮的喷射性收缩期杂音,伴收 缩期震颤,肺动脉第二心音减弱或消失。房间隔缺损因肺循环血流增加、肺动脉瓣相对 狭窄,胸骨左缘第 2~3 肋间闻及Ⅱ~Ⅲ级吹风样收缩期杂音,肺动脉瓣第二心音亢进伴 固定分裂。

85. BCD

【解析】严重肺功能不全属于支气管镜检查的禁忌证。

86. ABD

【解析】对恶性肿瘤的分期有助于合理制订治疗方案,正确地评价疗效,判断预后。国际 抗癌联盟提出的 TNM 分期法是目前被广泛采用的分期法,TNM 分期包括临床分期 (cTNM)和术后病理分期(pTNM)。T 为原发肿瘤、N 为淋巴结、M 为远处转移。在临 床无法判断肿瘤体积时则以 T<sub>x</sub>表示。

87. ABC

【解析】特异性感染,如结核、破伤风、气性坏疽、念珠菌病等,因致病菌不同,可有独特 的表现。铜绿假单胞菌属于非特异性感染的病原菌。

88. AB

【解析】择期手术是指可在充分的术前准备后选择合适时机进行手术,如一般的良性肿 瘤切除术及腹股沟疝修补术等。急性化脓性胆囊炎行胆囊切除术属于急症手术;结肠 癌行结肠癌根治术属于限期手术。

89. ABCD

【解析】输血传染的疾病:供血者的某些疾病通过静脉输血传播给患者,如病毒性肝炎、 艾滋病、疟疾、梅毒等。

90. ABD

【解析】膝关节置换术、心脏瓣膜置换术均属于需要植入人工制品的手术,需要预防性应 用抗生素;结肠癌根治术属于清洁-污染手术,需要预防性应用抗生素。甲状腺手术属 于清洁手术,手术野无污染,通常不需预防性应用抗菌药物。

2023 年成人高等学校招生全国统一考试

医学综合(专升本)试题

|    |   |   |   |    |
|----|---|---|---|----|
| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
| 得分 |   |   |   |    |

|      |     |
|------|-----|
| 得  分 | 评卷人 |
|      |     |

一、A 型题(1~44 小题,每小题 1.5 分;45~54 小题,每小题 2 分;共 86 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中,请选出一项最符合题目要求的。)

1. 在腕部,临床常用触摸脉搏的动脉是( )
- A. 桡动脉B. 尺动脉C. 腋动脉D. 肱动脉
2. 腹腔内不成对脏器(肝除外)的静脉血直接汇入的静脉系是( )
- A. 上腔静脉系B. 下腔静脉系C. 心静脉系D. 肝门静脉系
3. 下列属于内耳的结构是( )
- A. 骨半规管B. 咽鼓管C. 乳突小房D. 鼓室
4. 损伤后可能出现“垂腕”畸形的神经是( )
- A. 肌皮神经B. 正中神经C. 尺神经D. 桡神经
5. 大脑皮质书写区所在的部位是( )
- A. 额上回后部B. 额中回后部C. 额下回后部D. 颞上回后部

6. 下列属于成对脑颅骨的是( )
- A. 额骨B. 筛骨C. 蝶骨D. 顶骨
7. 十二指肠大乳头位于十二指肠的部位是( )
- A. 上部B. 降部C. 水平部D. 升部
8. 可封闭喉口,阻止食团误入喉腔的喉软骨是( )
- A. 甲状软骨B. 会厌软骨C. 杓状软骨D. 环状软骨
9. 通常精子与卵子结合的部位是( )
- A. 输卵管漏斗部B. 输卵管子宫部C. 输卵管壶腹部D. 输卵管峡部
10. 心脏正常的起搏点是( )
- A. 房室结B. 窦房结C. 房室束D. 左、右束支
11. 下列不属于小脑核的是( )
- A. 齿状核B. 栓状核C. 顶核D. 疑核
12. 关于局部电位的叙述,不正确的是( )
- A. 具有“全或无”特性B. 可总和C. 电位的幅度可大可小D. 可作电紧张性扩布
13. 心脏的前负荷是( )
- A. 大动脉血B. 心室舒张末期容积C. 心房收缩末期容积D. 心室收缩末期容积
14. 当动脉血压升高而其他因素不变时,心动周期中时间缩短的时相是( )
- A. 等容收缩期B. 心室射血期C. 等容舒张期D. 心室充盈期





C. 减少胃肠道手术时的污染

D. 防止术后腹胀, 早期恢复肠蠕动

第 5 页

2023 年成人高考

47. 为明确诊断,最重要的辅助检查是( )

A. 肝功能测定                      B. 腹部 B 超

47. 为明确诊断,最重要的辅助检查是( )

A. 肝功能测定                      B. 腹部 B 超





2023 年成人高等学校招生全国统一考试  
医学综合(专升本)试题参考答案

一、A 型题

1. A      2. D      3. A      4. D      5. B      6. D      7. B      8. B      9. C      10. B
11. D    12. A    13. B    14. B    15. C    16. A    1 7. B    18. D    19.
- B    20. A
21. B    22. B    23. C    24. D    25. A    26. B    27. B    28. C    29. B    30. B
31. C    32. D    33. A    34. D    35. A    36. D    37. C    38. B    39.
- A    40. D
41. A    42. B    43. C    44. A    45. D    46. D    47. C    48. C    49.
- B    50. A
51. A    52. D    53. D    54. C

二、B 型题

55. D    56. B    57. A    58. B    59. B    60. D    61. A    62. C    63. D    64. B
65. C    66. A    67. A    68. D    69. C    70. B

三、X 型题

71. ABC    72. ABD    73. ACD    74. ABC    75. ABD    76. AC    77. ABCD
78. ABD    79. ABC    80. ABD    81. ACD    82. ABC    83. ABC    84. ACD
85. ABCD    86. ABCD    87. ABCD    88. ABC    89. ABD    90. ABD

弥封线内不要答题



2022 年成人高等学校招生全国统一考试

医学综合(专升本)试题

|    |   |   |   |    |
|----|---|---|---|----|
| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
| 得分 |   |   |   |    |

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 评卷人 |
|    |     |

一、A 型题(1~44 小题,每小题 1.5 分;45~54 小题,每小题 2 分;共 86 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中,请选出一项最符合题目要求的。)

1. 棘突呈叠瓦状排列的椎骨是( )
- A. 颈椎

B. 胸椎

C. 腰椎

D. 骶骨
2. 合成胆总管的是( )
- A. 肝左管和肝右管

B. 肝右管和肝总管

C. 肝左管和肝总管

D. 胆囊管和肝总管
3. 站立时女性腹膜腔的最低部位是( )
- A. 阴道前穹

B. 阴道后穹

C. 膀胱子宫陷凹

D. 直肠子宫陷凹
4. 右主支气管的特点是( )
- A. 细而长

B. 走向较陡直

C. 粗而长

D. 走向较水平
5. 包被肾和肾上腺的结构是( )
- A. 肾筋膜

B. 肾脂肪囊

C. 肾纤维囊

D. 肾周围脂肪
6. 射精管的开口部位是( )
- A. 尿道前列腺部

B. 尿道膜部

- C. 尿道海绵体部

D. 尿道球
7. 上腔静脉注入的部位是( )
- A. 左心房

B. 左心室

C. 右心房

D. 右心室
8. 下列属于腹腔干分支的是( )
- A. 脾动脉

B. 胃右动脉

C. 胃网膜右动脉

D. 胃网膜左动脉
9. 膝反射消失时,可能受损的神经是( )
- A. 股神经

B. 胫神经

C. 腓深神经

D. 腓浅神经
10. 大脑皮质角回属于( )
- A. 视觉性语言区

B. 书写区

C. 运动性语言区

D. 听觉性语言区
11. 下列属于中耳的结构是( )
- A. 耳蜗

B. 前庭

C. 半规管

D. 鼓室
12. 决定神经细胞动作电位幅度的因素是( )
- A. 刺激强度

B. 刺激持续时间

C. 离子平衡电位

D. 阈电位水平
13. 血液凝固的实质是( )
- A. 纤维蛋白原转变为纤维蛋白

B. 纤维蛋白的降解

C. 凝血因子Ⅷ的激活

D. 血小板聚集
14. 心率超过 180 次/分,对心动周期最明显的影响是( )
- A. 等容收缩期延长

B. 快速射血期缩短

C. 等容舒张期延长

D. 快速充盈期缩短
15. 收缩压的高低主要反映的是( )
- A. 心率

B. 外周阻力

C. 循环血量

D. 每搏输出量
16. 影响气道阻力最重要的因素是( )
- A. 气流速度

B. 气流形式

C. 气道长度

D. 气道口径

17. 长期不能进食时,人体供能的主要方式是( )
- A. 糖转化为蛋白质 B. 糖转化为脂肪
- C. 脂肪转化为蛋白质 D. 蛋白质转化为糖
18. 肾素-血管紧张素系统被激活后产生的效应是( )
- A. 醛固酮分泌减少 B. 肾上腺素分泌减少
- C. 终尿水的排出增加 D. 终尿  $\text{Na}^+$  的排出减少
19. 与正视眼相比,近视眼的特点是( )
- A. 近点远,远点近 B. 近点和远点都远
- C. 近点近,远点远 D. 近点和远点都近
20. 突触前抑制应该具备的突触结构类型是( )
- A. 胞体—胞体型 B. 轴突—胞体型
- C. 轴突—轴突型 D. 轴突—树突型
21. 下列不属于快波睡眠的特征是( )
- A. 肌紧张减弱 B. 间断性心率加快
- C. 脑内蛋白质合成加快 D. 生长激素分泌明显增多
22. 生物活性最强、作用最迅速的甲状腺激素是( )
- A. 一碘酪氨酸 B. 二碘酪氨酸
- C. 三碘甲状腺原氨酸 D. 四碘甲状腺原氨酸
23. 女,17 岁。1 周前眼睑水肿,现进展为全身水肿。最可能的原因是( )
- A. 心源性水肿 B. 肝源性水肿
- C. 黏液性水肿 D. 肾源性水肿
24. 健康成人进行体格检查时,肺的叩诊音性质为( )
- A. 清音 B. 过清音
- C. 鼓音 D. 浊音
25. Horner 综合征的表现不包括( )
- A. 瞳孔缩小 B. 眼睑下垂
- C. 眼球内陷 D. 麻痹性斜视
26. 男,75 岁。咳喘 30 年。查体:胸廓前后径与横径之比为 1 : 1,肋骨与脊柱夹角大于  $45^\circ$ 。胸廓的形态为( )
- A. 正常胸廓 B. 扁平胸
- C. 漏斗胸 D. 桶状胸

27. 女,50 岁。平卧位腹部视诊为“蛙腹”。最可能存在的病理状态是( )
- A. 腹腔大量积气 B. 腹腔大量积液
- C. 巨大卵巢囊肿 D. 胰腺囊肿
28. 女,40 岁。心悸、呼吸困难、消瘦、腹胀 3 个月来诊。查体:BP105/85mmHg,心音明显减弱。最可能的病因是( )
- A. 二尖瓣狭窄 B. 甲状腺功能亢进症
- C. 缩窄性心包炎 D. 主动脉瓣关闭不全
29. 下列不属于既往史的是( )
- A. 传染病史 B. 外伤手术史
- C. 婚姻生育史 D. 药物过敏史
30. 不属于脑膜刺激征检查内容的是( )
- A. 颈强直 B. Kernig 征
- C. Brudzinski 征 D. Babinski 征
31. 女,45 岁。心悸 1 个月,心电图示同一导联可见 5 个不连续的期前出现的宽大畸形 QRS 波,其前无 P 波,T 波方向与主波方向相反,为完全性代偿间歇。其心律失常为( )
- A. 室性心动过速 B. 频发室性期前收缩
- C. 窦性心律不齐 D. 房室传导阻滞
32. 血常规检查结果异常的是( )
- A. 红细胞计数  $4.5 \times 10^{12}/\text{L}$  B. 白细胞计数  $4.9 \times 10^9/\text{L}$
- C. 网织红细胞 1.5% D. 血小板计数  $44 \times 10^9/\text{L}$
33. 尿常规检查不正常的结果是( )
- A. 离心尿镜检 RBC 2/HP B. 离心尿镜检 WBC 4/HP
- C. 尿胆原定性弱阳性 D. 尿胆红素定性阳性
34. 高钾血症的典型心电图表现是( )
- A. P-R 间期延长 B. T 波低平
- C. T 波高尖 D. T 波倒置
35. 破伤风患者通常最先受影响的肌群是( )
- A. 膈肌 B. 四肢肌
- C. 表情肌 D. 咀嚼肌

36. 男, 21 岁。因外伤致脾破裂, 紧急行脾切除术。术中输血 15ml 时发现术野渗血不止, 同时伴血压下降。应考虑输血并发症是( )

- A. 发热反应  
B. 过敏反应  
C. 溶血反应  
D. 细菌污染反应

37. 在血液成分制品中,冷沉淀属于( )

- A. 血细胞成分  
B. 血浆代用品  
C. 血浆成分  
D. 血浆蛋白成分

38. 急性肾衰竭少尿期常见的电解质紊乱是( )

- A. 低磷血症  
B. 高钾血症  
C. 低镁血症  
D. 高氯血症

39. 最易引起急性呼吸窘迫综合征的疾病是( )

- A. 急性阑尾炎  
B. 急性胃肠炎  
C. 急性胆囊炎  
D. 重症肺炎

40. 下列属于恶性肿瘤的疾病是( )

- A. 体表脂肪瘤  
B. 纤维黄色瘤  
C. 神经纤维瘤  
D. 黑色素瘤

41. 成人胸外心脏按压时,要在胸骨下 1/2 处垂直向胸骨加压,使胸骨下陷( )

- A. 2~3cm  
B. 5~6cm  
C. 7~9cm  
D. 10~12cm

42. 按中国新九分法,头颈面加躯干烧伤,烧伤面积的百分比是( )

- A. 9 %                                                  B. 18 %  
C. 27 %                                                  D. 36 %

43. 男, 34 岁。右手被开水烫伤 2 小时, 局部红肿, 有大小不一的水疱形成, 创面红润, 疼痛明显。其烧伤深度是( )

- A. I 度烧伤  
B. 浅 II 度烧伤  
C. 深 II 度烧伤  
D. III 度烧伤

44. 下列关于心肺复苏时药物治疗目的的叙述,错误的是( )

- A. 防治心律失常  
B. 激发心脏复跳  
C. 增强心肌迷走神经的张力  
D. 增强心肌收缩力

(45~47 题共用题干)

男, 20 岁。高热、咳脓性带臭味痰 1 周。既往 1 个月前有拔牙史。

45. 最可能感染的病原体是( )

- A. 肺炎链球菌  
B. 肺炎支原体  
C. 结核分枝杆菌  
D. 厌氧菌

46. 对诊断最有意义的辅助检查是( )

- A. 胸部 X 线  
B. 肺功能  
C. 血常规  
D. 红细胞沉降率

47. 最可能的诊断是( )

- A. 肺炎链球菌肺炎  
B. 肺结核  
C. 肺脓肿  
D. 肺癌

(48~50 题共用题干)

男,45岁。腹痛伴呕吐大量酸臭食物2天。3年前曾诊断“十二指肠球部溃疡”,幽门螺杆菌检测结果为阳性,未规范治疗。

48. 最可能出现的体征为( )

- A. 移动性浊音阳性  
B. 振水音阳性  
C. 肠鸣音消失  
D. 液波震颤阳性

49. 最可能的诊断是( )

- A. 反流性食管炎  
B. 急性胰腺炎  
C. 幽门梗阻  
D. 急性胆囊炎

50. 最重要的进一步检查是( )

- A. 胃肠减压后行胃镜检查  
B. 病理学检查  
C. 腹部 B 超  
D. 幽门螺杆菌检测

(51~52 题共用题干)

男,70岁。背部肿痛3天。糖尿病病史10年。查体:体温38.5℃,脉搏90次/分。背部有一直径10cm区域隆起,红热硬肿,压痛明显,表面有多个脓点。

51. 最可能的诊断是( )

- A. 疖  
B. 痈  
C. 皮下急性蜂窝织炎  
D. 丹毒

52. 此疾病的最佳局部处理措施为( )

- A. 热敷                      B. 碘伏涂抹



74. 参与桡腕关节组成的结构有( )
- A. 尺骨下端

B. 桡骨下端

C. 手舟骨

D. 月骨
75. 主动脉弓的分支有( )
- A. 左颈总动脉

B. 左锁骨下动脉

C. 头臂干

D. 冠状动脉
76. 细胞兴奋性低于正常的时期有( )
- A. 绝对不应期

B. 相对不应期

C. 超常期

D. 局部反应期
77. 缩胆囊素的作用有( )
- A. 促进胰酶的分泌

B. 对胰腺的营养作用

C. 抑制胃液的分泌

D. 抑制肠运动
78. 卵巢分泌的激素有( )
- A. 雌二醇

B. 孕酮

C. 卵泡刺激素

D. 抑制素
79. 肺表面活性物质的作用包括( )
- A. 防止肺泡萎陷

B. 增加吸气阻力

C. 稳定大小肺泡的容积和内压

D. 防止肺水肿
80. 可以增加终尿量的因素有( )
- A. 循环血量减少

B. 抗利尿激素分泌减少

C. 醛固酮分泌增多

D. 肾血流量增加
81. 可能引起颈静脉怒张的原因有( )
- A. 左心衰竭

B. 右心衰竭

C. 肾盂积水

D. 上腔静脉阻塞综合征
82. 反映自主神经调节功能的检查包括( )
- A. 膝反射

B. 角膜反射

C. 皮肤划痕试验

D. 卧立位试验
83. 腰椎穿刺术的禁忌证包括( )
- A. 脑膜炎

B. 休克

C. 穿刺部位皮肤感染

D. 脑疝
84. 大量心包积液患者可能出现的体征包括( )
- A. 颈静脉怒张

B. 心界扩大

C. 奇脉

D. 心音增强

85. 可用于肝脏触诊检查的方法包括( )
- A. 浅部触诊法

B. 深部滑行触诊法

C. 双手触诊法

D. 冲击触诊法
86. 代谢性酸中毒的原因包括( )
- A. 肠道内体液大量丧失

B. 体内  $\text{HCO}_3^-$  减少

C. 有效循环不足

D. 呼吸道梗阻
87. 肠外营养的并发症包括( )
- A. 电解质紊乱

B. 肠道免疫功能障碍

C. 高血糖

D. 肝脏损害
88. 创伤并发症包括( )
- A. 感染

B. 休克

C. 应激性溃疡

D. 凝血功能障碍
89. 输血的适应证有( )
- A. 大量失血

B. 严重贫血

C. 重症感染

D. 凝血异常
90. 切口感染的预防措施包括( )
- A. 术中严格遵守无菌原则

B. 操作精细、严密止血

C. 术前、术后提高免疫力

D. 常规应用抗生素



2022 年成人高等学校招生全国统一考试  
医学综合(专升本)试题参考答案

一、A 型题

1. B    2. D    3. D    4. B    5. A    6. A    7. C    8. A    9. A    10. A
11. D   12. C   13. A   14. D   15. D   16. D   17. D   18. D   19. D   20. C
21. D   22. C   23. D   24. A   25. D   26. D   27. B   28. C   29. C   30. D
31. B   32. D   33. D   34. C   35. D   36. C   37. C   38. B   39. D   40. D
41. B   42. D   43. B   44. C   45. D   46. A   47. C   48. B   49. C   50. A
51. B   52. D   53. C   54. B

二、B 型题

55. C   56. B   57. B   58. A   59. B   60. A   61. B   62. B   63. C   64. D
65. A   66. D   67. A   68. D   69. C   70. A

三、X 型题

71. ABC    72. ABD    73. ABC    74. BCD    75. ABC    76. ABD    77. ABC
78. ABD    79. ACD    80. BD    81. BD    82. CD    83. BCD    84. ABC
85. BCD    86. ABC    87. ABCD    88. ABCD    89. ABCD    90. ABC

弥封线内不要答题

2021 年成人高等学校招生全国统一考试  
医学综合(专升本)试题

|    |   |   |   |    |
|----|---|---|---|----|
| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
| 得分 |   |   |   |    |

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 评卷人 |
|    |     |

一、A 型题(1~44 小题,每小题 1.5 分;45~54 小题,每小题 2 分;共 86 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中,请选出一项最符合题目要求的。)

1. 冠状动脉的起始部位是( )  
A. 左心室  
B. 主动脉弓  
C. 胸主动脉  
D. 升主动脉
2. 心脏内兴奋传导最慢的组织是( )  
A. 窦房结  
B. 浦肯野纤维  
C. 房室结  
D. 心室肌
3. 不含消化酶的消化液是( )  
A. 胰液  
B. 胃液  
C. 胆汁  
D. 肠液
4. 下列描述中属于症状的是( )  
A. 脾大  
B. 心脏杂音  
C. 肺部啰音  
D. 心悸
5. 属于腹膜内位器官的是( )  
A. 横结肠  
B. 直肠  
C. 降结肠  
D. 升结肠
6. 属于肾锥体的结构是( )  
A. 肾窦  
B. 肾乳头  
C. 肾小盏  
D. 肾柱

7. 具有上行唤醒作用的神经结构被称为( )  
A. 特殊感觉传入纤维  
B. 本体感觉传入通路  
C. 内脏感觉传入神经  
D. 感觉的非特异性投射系统
8. 调节产热活动最重要的体液因素是( )  
A. 甲状腺激素  
B. 甲状旁腺激素  
C. 胰岛素  
D. 生长激素
9. 房水产生的部位是( )  
A. 睫状体  
B. 虹膜  
C. 角膜  
D. 脉络膜
10. 胸膜下界的体表投影在腋中线相交于( )  
A. 第 8 肋  
B. 第 9 肋  
C. 第 10 肋  
D. 第 11 肋
11. 可做环转运动的关节是( )  
A. 膝关节  
B. 踝关节  
C. 肘关节  
D. 桡腕关节
12. 输血应遵循的原则是( )  
A. 受血者红细胞不被供血者血清凝集  
B. 供血者和受血者的凝集素含量应相等  
C. 受血者红细胞不发生叠连  
D. 供血者红细胞不被受血者血清凝集
13. 胆汁瘀积性黄疸典型的临床表现是( )  
A. 尿呈酱油色  
B. 腰背疼痛  
C. 贫血、脾大  
D. 陶土样粪便
14. 腹部九分法脾的位置在( )  
A. 上腹部  
B. 中腹部  
C. 右季肋部  
D. 左季肋部
15. 迅速失血可导致休克,出血量至少超过全身总血量的比例是( )  
A. 20%  
B. 30%  
C. 40%  
D. 50%
16. 需长期肠外营养支持者,首选的穿刺血管是( )  
A. 颈外静脉  
B. 大隐静脉  
C. 颈内静脉  
D. 腓静脉

17. 视近物时,形态改变最显著的眼结构是( )

A. 巩膜

B. 角膜

C. 玻璃体

D. 晶状体
18. 女,51 岁。下列问诊中属于个人史的是( )

A. 出生地与居住地

B. 闭经日期,绝经年龄

C. 结婚年龄,配偶健康状况

D. 妊娠与生育次数
19. 男,62 岁。急性心肌梗死第 2 天,排便中突发呼吸困难。查体:BP 90/70mmHg,P 120 次/分,呼吸急促,双肺满布湿啰音及哮鸣音。最可能的诊断是( )

A. 乳头肌功能不全

B. 支气管哮喘

C. 急性心脏压塞

D. 急性左心衰竭
20. 静脉补钾速度一般每小时不宜超过( )

A. 70mmol

B. 60mmol

C. 50mmol

D. 20mmol
21. 急性肾衰竭少尿期或无尿期,需紧急处理的电解质紊乱是( )

A. 高钾血症

B. 高钠血症

C. 低氯血症

D. 低镁血症
22. 下列最符合内环境稳态概念的描述是( )

A. 组织液理化性质相对稳定

B. 血浆各成分保持恒定

C. 细胞质渗透压稳定

D. 细胞内液 pH 相对稳定
23. 汇合形成上腔静脉的是( )

A. 颈内静脉与锁骨下静脉

B. 左、右头臂静脉

C. 颈内静脉与奇静脉

D. 颈外静脉与锁骨下静脉
24. 腭扁桃体所在的位置是( )

A. 鼻咽侧壁

B. 喉咽侧壁

C. 口咽侧壁

D. 喉前庭侧壁
25. 男,66 岁。反复咯血 3 年。查体:双下肺固定湿啰音,胸部 X 线片提示双下肺纹理粗乱。最可能的诊断是( )

A. 支气管扩张症

B. 结核性胸膜炎

C. 支气管肺炎

D. 肺脓肿
26. 患者血气分析报告:pH 7.24,PaCO<sub>2</sub> 76mmHg,PaO<sub>2</sub> 55mmHg,HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 32mmol/L, BE 4.5mmol/L。应判定为( )

A. 失代偿性代谢性酸中毒

B. 失代偿性呼吸性碱中毒

C. 代偿性呼吸性酸中毒

D. 失代偿性呼吸性酸中毒
27. 女,62 岁。诊断为胃癌。查体:血压 150/100mmHg,消瘦,重度贫血。下列术前准备中,不必要的项目是( )

A. 纠正贫血

B. 血压降至正常

C. 检测肝功能

D. 改善营养状态
28. 男,60 岁。餐后突感上腹痛、大汗 1 小时。查体:腹肌紧张,压痛、反跳痛(+),肝浊音界消失。此时应首选的检查是( )

A. 立位腹平片

B. 血、尿淀粉酶

C. 腹部 B 超

D. 心电图
29. 静脉快速注入大量生理盐水、血浆蛋白合成减少、血浆蛋白丢失,可导致( )

A. 有效滤过压下降,肾小球滤过率减少

B. 血浆胶体渗透压下降,肾小球滤过率增加

C. 肾血流量和血压下降

D. 囊内压增高,有效滤过压下降
30. 代谢性碱中毒常同时存在的电解质紊乱是( )

A. 高钾血症

B. 低钠血症

C. 高钠血症

D. 低钾血症

弥封线内不要答题



- C. 右中下肺叩诊过清音  
D. 右中下肺叩诊浊音
46. 为进一步明确胸腔积液的原因,最有意义的辅助检查是( )
- A. 肿瘤标志物测定  
B. 胸部 B 超  
C. 红细胞沉降率  
D. 胸腔穿刺液检查
47. 该患者最可能的诊断是( )
- A. 结核性胸膜炎  
B. 肺炎伴胸腔积液  
C. 肺癌伴胸膜转移  
D. 化脓性胸膜炎

(48~49 题共用题干)

- 男,18 岁。右足和右小腿被开水烫伤,有水疱,伴剧痛,创面基底部肿胀、红润。
48. 该患者烧伤面积为( )
- A. 20%  
B. 15%  
C. 10%  
D. 5%
49. 该患者烧伤深度为( )
- A. I 度  
B. 浅 II 度  
C. 深 II 度  
D. III 度

(50~52 题共用题干)

- 男,46 岁。既往有扩张型心肌病病史 5 年。入院查体:脉率 86 次/分,呼吸 18 次/分,心率 102 次/分,心律绝对不齐,第一心音强弱不等。
50. 该患者脉搏特点应为( )
- A. 交替脉  
B. 脉搏短绌  
C. 水冲脉  
D. 奇脉
51. 最可能的心律失常类型是( )
- A. 窦性心动过速  
B. 窦性心动过缓  
C. 室上性心动过速  
D. 心房颤动
52. 为明确心律失常的诊断,最佳的辅助检查是( )
- A. 心电图  
B. 心脏负荷试验  
C. 冠状动脉造影  
D. 胸部 X 线

(53~54 题共用题干)

- 男,40 岁。腹痛、发热 48 小时。查体:体温 39℃,血压 80/60mmHg,意识清楚,面色苍白,四肢湿冷,全腹肌紧张,肠鸣音消失。

53. 患者最可能的诊断是( )
- A. 低血容量性休克  
B. 心源性休克  
C. 神经源性休克  
D. 感染性休克
54. 目前状态下,患者最合理的治疗措施是( )
- A. 抗休克同时治疗感染  
B. 输血  
C. 应用血管活性药  
D. 糖皮质激素治疗

|     |     |
|-----|-----|
| 得 分 | 评卷人 |
|     |     |

二、B 型题(55~70 小题,每小题 1.5 分,共 24 分。A、B、C、D 是其中两道小题的备选项,请从中选择一项最符合题目要求的,每个选项可以被选择一次或两次。)

- A. 毛细血管血压升高,组织液生成增加  
B. 血浆胶体渗透压下降,组织液生成增加  
C. 毛细血管通透性增加,组织液生成减少  
D. 淋巴液回流受阻,组织液生成减少
55. 静脉回流受阻时( )
56. 低蛋白血症时( )
- A. Cheyne-Stokes 呼吸  
B. 叹气样呼吸  
C. Kussmaul 呼吸  
D. Biots 呼吸
57. 女,68 岁。尿毒症酸中毒。查体:意识障碍,呈深而快的呼吸。该患者呼吸称为( )
58. 男,81 岁。急性脑血管病。查体:意识障碍,呼吸由浅慢逐渐变为深快,然后再由深快转为浅慢,暂停一段后又重复上述变化。该患者呼吸称为( )
- A. 卵泡刺激素  
B. 黄体生成素  
C. 抑制素  
D. 孕激素
59. 排卵时血液中浓度最高的激素是( )
60. 刺激雌激素生成的关键激素是( )
- A. 胆囊底  
B. 胆总管  
C. 胆囊管  
D. 胆囊体





- C. 110~130mmHg

D. 140~160mmHg
85. 输精管的分部有(     )
- A. 睪丸部

B. 精索部

C. 腹股沟管部

D. 盆部
86. 影响心输出量的因素有(     )
- A. 循环血量

B.  $\alpha$  受体阻断剂

C. 心率

D. 心室舒张末期容积
87. 输血时出现发热反应的原因有(     )
- A. 免疫反应

B. 致热原

C. 蛋白质过敏

D. 循环超负荷
88. 属于检查肾小球功能的实验室项目有(     )
- A. 血肌酐

B. 尿渗透压

C. 内生肌酐清除率

D. 血尿素氮
89. 胃和小肠共有的运动形式有(     )
- A. 分节运动

B. 紧张性收缩

C. 容受性舒张

D. 蠕动
90. 可引起肾性急性肾衰竭的病因有(     )
- A. 前列腺增生

B. 感染性休克

C. 挤压综合征

D. 手术误扎双侧输尿管

2021 年成人高等学校招生全国统一考试

医学综合(专升本)试题参考答案

一、A 型题

1. D

2. C

3. C

4. D

5. A

6. B

7. D

8. A

9. A

10. C
11. D

12. D

13. D

14. D

15. A

16. C

17. D

18. A

19. D

20. D
21. A

22. A

23. B

24. C

25. A

26. D

27. B

28. A

29. B

30. D
31. A

32. C

33. B

34. D

35. A

36. D

37. B

38. C

39. A

40. B
41. D

42. B

43. A

44. B

45. D

46. D

47. A

48. C

49. B

50. B
51. D

52. A

53. D

54. A

二、B 型题

55. A

56. B

57. C

58. A

59. B

60. A

61. A

62. B

63. C

64. A
65. C

66. B

67. C

68. C

69. A

70. D

三、X 型题

71. ABCD

72. AD

73. ACD

74. AB

75. AD

76. BCD

77. ACD
78. CD

79. ABD

80. ABD

81. ACD

82. ABCD

83. BCD

84. BCD
85. ABCD

86. CD

87. AB

88. ACD

89. BD

90. BC